

Analdehner

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wozu wird der Analdehner angewendet?

Der Analdehner dient zur vorsichtigen Erweiterung des Analkanals und des Schließmuskels sowie der Verbesserung der Elastizität bei Erkrankungen am After. Dies führt zur Entspannung eines verkrampften Schließmuskels, fördert die Durchblutung und beugt Schließmuskelkrämpfen vor.

Die Anwendung erfolgt häufig zusammen mit Salben, die zur Behandlung der Beschwerden bei Hämorrhoidalerkrankungen dienen.

Wie sollten Sie den Analdehner anwenden?

Zur besseren Gleitfähigkeit wird der Analdehner, bevor er in den Analkanal eingeführt wird, dünn mit Salbe bestreichen, ggf. kann auch auf die Spitze des Analdehners etwas Salbe aufgetragen werden. Das Einführen wird dadurch wesentlich erleichtert und zusätzliche Schmerzen werden vermieden.

Bei der Anwendung empfiehlt sich eine entspannte Körperhaltung, entweder in Hockstellung oder seitlich liegend.

Der Analdehner wird unter Drehbewegung vorsichtig so weit eingeführt, wie es ohne Schmerzen möglich ist und dann unter Drehen abwechselnd vor und zurück bewegt. Dabei wird die Verkrampfung der Aftermuskulatur gelockert und aufgetragene Salbe wird gleichzeitig in feinste Risse und Falten des Analkanals einmassiert.

Normalerweise sollte der Analdehner etwa 2-mal täglich jeweils ca. 2 Minuten lang angewendet werden. Dabei empfiehlt es sich, den Analdehner mehrmals (10- bis 15-mal) langsam einzuführen. Im Laufe der Behandlung sollte versucht werden, den Analdehner schrittweise tiefer in den Analkanal vorzuschieben. Der Erfolg der Behandlung hängt im Wesentlichen von der Regelmäßigkeit der Anwendung ab.

Als zusätzliche Übung empfiehlt es sich, nach Einführen des Analdehners die Schließmuskulatur gegen den Widerstand des Dehners mehrmals kräftig zuzukneifen. Diese Maßnahme kann den Schließmuskel und eine geschwächte Beckenbodenmuskulatur wieder kräftigen.

Bitte besprechen Sie die Anwendung des Analdehners mit Ihrem Arzt.

Nach dem Gebrauch reinigen Sie den Analdehner bitte mit Toilettenpapier und warmem Wasser.


Vor jeder Wiederverwendung muss der Analdehner auf offensichtliche Beschädigungen geprüft werden. Analdehner mit offensichtlichen Beschädigungen dürfen nicht wieder verwendet werden, sondern sollten im Hausmüll entsorgt werden.

Stand der Information: 2023-07

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
 Rigistrasse 2, 12277 Berlin, Deutschland
 Telefon: +49 30 72082-0
 Telefax: +49 30 72082-200
 E-Mail: info@kade.de, www.kade.de, www.pogesund.de



Der Analdehner ist zur mehrmaligen Anwendung durch eine einzelne Person vorgesehen.



Išangės plėtklis

Mielas paciente,

prašau jidėmai perskaityti šią vartotojo instrukciją, nes čia pateikta svarbi informacija apie prietaiso naudojimą. Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Kam naudojamas išangės plėtklis?

Išangės plėtklis naudojamas švelniams išangės kanalo ir rauko praplėtimui, taip pat išangės raumenų elastingumui pagerinti esant išangės negalavimams. Išangės plėtklis atpalaiduoja išitempusius išangės rauko raumenis, pagerina kraujotaką ir taip apsaugo nuo tolimesnių išangės rauko spazmų.

Plėtklis dažniausiai naudojamas kartu su tepalu, skirtu hemorojaus simptomams gydyti.

Kaip naudojamas išangės plėtklis?

Prieš kišant į išangės kanalą, plėtklį reikia padengti plonu tepalo sluoksniu, kad jis geriau slystu. Taip pat truputį tepalu galima užtepti ant plėtklio viršūnės. Tai palengvina plėtklikio įkišimą ir padeda išvengti papildomo skausmo.

Plėtklį rekomenduojama naudoti atsipalaidavus, t.y. atsitūpus arba atsigulus ant šono. Išangės plėtklis kišamas atsargiai, sukinejant tai į kairę, tai į dešinę. Kišama yra tol, kol įmanoma įkišti nesukeliant skausmo, po to kelis kartus atliekami judesiai pirmyn ir atgal. Taip sumažinamas išangės rauko tonusas ir kartu vartojamas tepalas gali prasiskverbti į išangės kanalo plyšius bei klostes.

Paprastai išangės plėtkliu patariama naudotis 2 kartus per dieną maždaug po 2 minutes. Procedūros metu plėtklikį į išangę reikėtų kišti keletą kartų (10-15 kartų). Toleisnio gydymo metu išangės plėtklį reikėtų bandyti palaipsniui įkišti į išangės kanalą kiek galima giliau. Gydymo sekムe iš esmės priklauso nuo reguliaraus plėtklio naudojimo.

Papildomai siūloma mankštinti išangės rauko raumenis, juos kelis kartus sutraukiant, kai įkištas plėtklis. Šis pratimas padės stiprinti išangės rauko ir dubens dugno raumenis.

Pasitarkite su gydytoju dėl išangės plėtklio naudojimo.

Panaudojus išangės plėtklį reikia nuplauti šiltame vandenye ir nusausinti tualetiniu popieriumi.

Kiekvieną kartą prieš pradēdam i naudoti plėtkliklį apžiūrėkite, ar jis nera akivaizdžiai sugadintas. Negalima naudoti akivaizdžiai sugadintų plėtklių; juos reikia išmesti su buitinėmis atliekomis.

Paskutinė teksto peržiuros data: 2023-07



DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
 Rigistrasse 2, 12277 Berlynas, Vokietija
 Telefonas +49 30 72082-0
 faksas +49 30 72082-200
 El. paštas: info@kade.de
www.kade.de

Atstovas Lietuvoje:

UAB Morfėjus
 Žalgirio g. 93-42, 08218 Vilnius, Lietuva
 Telefonas +370 5 2796328
 El. paštas: info@morfiejus.lt
www.hemorojus.lt



Išangės plėtklis skirtas daugkartiniams naudojimui vienam asmeniui.



Dilatator doodbytniczy

Drogi Pacjencie,

Należy przeczytać ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące stosowania wyrobu medycznego. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan dodatkowej porady lub informacji, proszę zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W jakim celu stosuje się dilatator doodbytniczy?

Dilatator doodbytniczy stosuje się w celu delikatnego rozszerzenia zwieraczy odbytu i kanału odbytniczego, a także poprawienia elastyczności mięśni odbytu w przebiegu chorób odbytu. Jego stosowanie doprowadza do rozluźnienia napiętych mięśni zwieraczy, poprawy krążenia krwi, a ponadto zapobiega skurczom zwieraczy odbytu.

W leczeniu choroby hemoroidalnej zaleca się używanie dilatatora w połączeniu z maścią stosowaną w leczeniu dolegliwości hemoroidalnych.

W jaki sposób należy używać dilatatora doodbytniczego?

Przed wprowadzeniem dilatatora do kanału odbytniczego należy posmarować go cienką warstwą maści w celu nadania mu odpowiednich właściwości poślizgowych. Dodatkowo, jeśli jest to konieczne, można nałożyć niewielką ilość maści na końcówkę dilatatora. W ten sposób wprowadzenie będzie zdecydowanie prostsze i pozwoli uniknąć ewentualnego bólu.

Podczas używania dilatatora zaleca się przyjęcie rozlużnionej pozycji leżącej bądź kucznej. Dilatator należy wprowadzać do odbytu delikatnie, tak głęboko, jak tylko jest to możliwe bez wywoływania bólu, jednocześnie obracając go w prawo i w lewo, wielokrotnie przesuwając do tyłu i do przodu. W ten sposób napięte mięśnie zwieraczy odbytu ulegają rozluźnieniu, a ponadto maść zostaje cienko wmasowana w najmniejsze szczeliny i fałdy kanału odbytniczego.

Zaleca się stosowanie dilatatora 2 razy dziennie przez około 2 minuty. Podczas używania należy wprowadzać dilatator powoli, kilkanaście razy z rzędu (10 - 15 razy). W przebiegu leczenia powinno się podejmować próby wprowadzania dilatatora stopniowo coraz głębiej do kanału odbytu. Sukces leczenia jest w głównej mierze uzależniony od regularnego używania dilatatora.

Ponadto, jako dodatkowe ćwiczenie zaleca się wielokrotne, aktywne zaciskanie mięśni zwieraczy na dilatatorze, co powoduje wzmacnienie zarówno mięśni zwieraczy, jak również słabych mięśni dna miednicy.

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Po użyciu wytrzyj dilatator papierem toaletowym i umyj ciepłą wodą.

Każdorazowo przed ponownym użyciem dilatatora należy sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń. Dilatatorów z widocznymi uszkodzeniami nie wolno ponownie używać, należy je wyrzucić wraz z odpadami domowymi.

Dodatkowe informacje na temat choroby hemoroidalnej możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.hemoroidy.info.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 2023-07



DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistrasse 2, 12277 Berlin, Niemcy
tel.: +49 30 72082-0
fax: +49 30 72082-200
e-mail: info@kade.de
www.kade.de

Dystrybutor w Polsce:

Kadefarm Sp. z o.o., Sierosław, ul. Gipsowa 18
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
tel.: +48 61 862 99 43
e-mail: kadefarm@kadefarm.pl
www.kadefarm.pl



Dilatator doodbytniczy jest przeznaczony do wielokrotnego użytku przez jedną osobę.