

Gebrauchsinformation

Bitte aufmerksam lesen!

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Bei Fragen oder auftretenden Nebenwirkungen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Biokalzium WR

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Tablette (550 mg) enthält: arzneilich wirksame Bestandteile:

Achillea millefolium Trit. D8 50,0mg, Acidum silicicum Trit. D10 50,0mg,
Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D8 50,0mg, Calcium fluoratum Trit. D8
50,0mg, Kalium phosphoricum Trit. D8 50,0mg, Natrium chloratum Trit. D8 50,0mg,

Sonstige Bestandteile:

Lactose-Monohydrat, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat (pflanzlich)

Die Bestandteile werden über die letzten beiden Stufen gemäß HAB,
Vorschrift 40c gemeinsam potenziert.

1 Tablette enthält 480mg Lactose entsprechend ca. 0,05 Broteinheiten.

Darreichungsform und Packungsgröße:

Originalverpackung mit 50 Tabletten zum Einnehmen

Anwendungsbereich:

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist
medizinischer Rat einzuholen.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Wulf Rabe's Biologische Mittel
adjupharm GmbH, Lily-Braun-Str. 48, 23843 Bad Oldesloe,
Tel.: 04531-67 92 76, Fax: 04531-67 93 23
Email: info@adjupharm.de
www.wulf-rabe.de

Hersteller:

Spreewälder Arzneimittel GmbH, 15913 Märkische Heide

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweis:

Diese Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Biokalzium WR daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte Biokalzium WR in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Gebrauchsinformation

Bitte aufmerksam lesen!

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker.

Dosierung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:

1-3mal täglich eine Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Eine Tablette enthält 480mg Lactose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker.

Hinweis zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äusseren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Arzneimittel sorgfältig und für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Lagerhinweis: Nicht über 25°C lagern!

Stand der Information:

08/2011



WR01G-BZ