

Bloxaphte® Oral Care Junior Gel:

- Schnelle Linderung von Beschwerden und Schmerzen.
- Fördert die Abheilung von Aphthen und verkürzt deren Dauer.
- Enthält keinen Alkohol (kein brennendes Gefühl).
- Enthält keine Parabene
- Ohne Zucker

Dank seiner besonderen Zusammensetzung schafft Bloxaphte® Oral Care Junior Gel eine wirksame Barriere, die eine rasche Linderung der örtlichen Schmerzen ermöglicht und die Abheilung von Aphthen fördert. Der Geschmack roter Früchte sorgt für eine angenehme Anwendung bei Kindern.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Aphthen
Stomatitis aphthosa

ZUSAMMENSETZUNG:

Wasser, Xylitol, Glycerin, Blütenextrakt von Rosa damascena, Xanthangummi, Polycarboxyl (1,3 %), Natriumhydroxid, Hyaluronsäure-Natriumsalz (0,24 %), Pectin, Kaliumsorbat (0,2 %), Natriumbenzoat (0,2 %), Stevia, Panthenol, Wildbeerenaroma, Blattextrakt von Aloe barbadensis (0,05 %).

ANWENDUNG UND DOSIERUNG:

Nach einer Mahlzeit mit sauberen Fingern oder einem Watteestäbchen eine kleine Menge Gel auf den betroffenen Bereich auftragen. Eine Woche lang oder bis zum Abklingen der Symptome zwei- bis dreimal täglich (oder bei Bedarf auch häufiger) anwenden. Nach jeder Anwendung wieder verschließen. Es wird empfohlen, nach der Anwendung mindestens 30 Minuten lang nicht zu essen oder zu trinken, um das Anhaften des Produkts zu fördern.

Die Anwendung des Produkts bei Kindern unter 30 Monaten wird nicht empfohlen.

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG:

Nicht über 25 °C lagern. Das Verfalldatum bezieht sich auf das ungeöffnete und korrekt gelagerte Produkt. Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht verwenden.

Nach Anbruch innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

Restmengen oder Produkte mit abgelaufenem Verfalldatum können im Haushaltsabfall entsorgt werden.

WARNHINWEISE:

- Das Produkt darf nur in der Mundhöhle angewendet werden.
- Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Bestandteile.
- Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Arzt oder Apotheker informieren, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.
- Es wird empfohlen, bei der Anwendung des Produkts einen Abstand von mindestens 2 Stunden zu Arzneimitteln und anderen Ergänzungsmitteln einzuhalten.
- Wenn sich die Beschwerden nicht bessern, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Nicht in Schwangerschaft und Stillzeit ohne ärztliche Rücksprache anwenden.
- Nach jeder Anwendung wieder verschließen.
- Das Verfalldatum bezieht sich auf das ungeöffnete und korrekt gelagerte Produkt.
- Wenden Sie nicht mehr als die empfohlene Tagesdosis an.
- Produkt nicht verwenden, wenn das Behältnis beschädigt oder bereits geöffnet ist.
- Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht verwenden.
- Bei der Anwendung des Produkts Gebrauchsanweisung beachten.
- Ordnungsgemäß entsorgen.
- Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

NEBENWIRKUNGEN:

Laut der wissenschaftlichen Literatur sind keine Nebenwirkungen bekannt oder zu erwarten, die mit der Anwendung des Produkts verbunden sind. Wenn bei der Anwendung unerwünschte Wirkungen auftreten, suchen Sie ärztliche Hilfe auf. Schwere Ereignisse sollten dem Hersteller und der national zuständigen Behörde gemeldet werden, von denen Sie weitere Auskünfte bekommen.

Tube zu 15 ml

(DE)

Bloxaphte® Oral Care Junior Gel:

- Soulage et atténue la douleur rapidement
- Facilite la cicatrisation des aphtes, en réduisant leur durée
- Sans alcool (ne brûle pas)
- Sans parabène
- Sans sucre

(FR)

Grâce à sa composition particulière, Bloxaphte® Oral Care Junior Gel agit en créant une barrière efficace qui permet une réduction rapide de la douleur locale et favorise la cicatrisation des aphtes. Les enfants apprécient particulièrement ses arômes de fruits rouges.

INDICATIONS :

Aphthes
Stomatite aphteuse

COMPOSITION :

Eau, xylitol, glycérol, extrait de pétales de Rosa damascena, gomme de xanthane, polycarboxyle (1,3 %), hydroxyde de sodium, hyaluronate de sodium (0,24 %), pectine, sorbate de potassium (0,2 %), benzoate de sodium (0,2 %), stévia, panthénol, arômes naturels de fruits rouges, extrait de feuille d'Aloe barbadensis (0,05 %).

UTILISATION ET POSOLOGIE :

Appliquer une petite quantité de gel sur la zone concernée, avec un doigt propre ou un coton-tige. Utiliser deux ou trois fois par jour (ou plus, au besoin) pendant une semaine ou jusqu'à disparition des symptômes. Reboucher après chaque application. Il est recommandé de ne pas manger ou boire pendant au moins 30 minutes après le bain de bouche, et ce afin de faciliter l'action du produit.

L'utilisation du produit n'est pas recommandée chez l'enfant de moins de 30 mois.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Conserver à une température inférieure à 25 °C. La date de péremption correspond au produit non ouvert, conservé de manière appropriée. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Utiliser dans les 30 jours après ouverture.

Le produit restant ou périmé peut être éliminé avec les déchets ménagers.

AVERTISSEMENTS :

- Le produit doit être utilisé dans la cavité buccale.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un ou plusieurs des composants.
- Il est recommandé d'informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
- Il est recommandé d'attendre au moins 2 heures avant d'utiliser tout autre médicament ou complément alimentaire.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement sans avoir consulté votre médecin.
- Reboucher après chaque application.
- La date de péremption correspond au produit non ouvert, conservé de manière appropriée.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne pas utiliser le produit si le flacon est endommagé ou ouvert.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Utiliser le produit conformément aux instructions.
- Éliminer conformément aux consignes de tri.
- Tenir hors de portée des enfants.

EFFETS SECONDAIRES :

D'après la littérature scientifique, aucun effet indésirable connu ou prévisible n'a été rapporté en lien avec l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables au cours de l'utilisation, consulter un médecin. Tout incident grave doit être signalé au fabricant et à l'autorité locale compétente qui indiqueront la conduite à tenir.

Tube de 15 ml

Bloxaphte® Oral Care Gel Junior

- Lenisce rapidamente i fastidi e il dolore
- Agevola la guarigione delle afte riducendone la durata
- Non contiene alcool (non brucia)
- Non contiene parabeni
- Senza zucchero

In virtù della sua speciale composizione, Bloxaphte® Oral Care Gel Junior forma una barriera efficace e consente di lenire rapidamente il dolore, agevolando il processo di guarigione delle afte.

Il gusto ai frutti rossi lo rende particolarmente gradevole per i bambini.

INDICAZIONI

Afte

Stomatite aftosa.

COMPOSIZIONE

Acqua, xilitolo, glicerina, estratto di petali di Rosa damascena, gomma xantana, poliacarbofill (1,3%), sodio idrossido, sale sodico di acido ialuronico (0,24%), pectina, potassio sorbato (0,2%), sodio benzoato (0,2%), stevia, pantenolo, aromi naturali di frutti rossi, estratto di foglie di Aloe barbadensis (0,05%).

USO E DOSAGGIO

Applicare una modica quantità di gel sull'area interessata, dopo i pasti, con le dita pulite o un bastoncino di cotone. Applicare due o tre volte al giorno (o con maggiore frequenza, se necessario) per una settimana o fino alla scomparsa dei sintomi. Richiudere dopo ogni applicazione. Si raccomanda di non mangiare o bere per almeno 30 minuti dopo l'applicazione al fine di agevolare l'adesione del prodotto.

L'uso del prodotto è controindicato nei bambini fino a 30 mesi di età.

STOCAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione.

IT

Utilizzare entro 30 giorni dalla prima apertura.

Il prodotto residuo o scaduto può essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

AVVERTENZE

- Utilizzare il prodotto nella cavità orale.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale a uno o più componenti.
- Si raccomanda di consultare il medico o il farmacista se si sta utilizzando, si è utilizzato di recente o si potrebbe utilizzare qualsiasi altro farmaco.
- Si consiglia di utilizzare a distanza di almeno 2 ore da medicinali e altri integratori.
- Se i sintomi non migliorano consultare un medico.
- Non utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento, senza consultare il proprio medico.
- Richiudere dopo ogni applicazione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato.
- Non superare la dose giornaliera raccomandata.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore è danneggiato o non è integro.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza stampata sulla confezione.
- Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.
- Smaltire correttamente.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

EFFETTI INDESIDERATI

Secondo la letteratura scientifica, non ci sono effetti avversi noti o prevedibili associati all'uso del prodotto. In caso di comparsa di effetti indesiderati durante l'uso, consultare un medico. Eventuali incidenti gravi devono essere segnalati al fabbricante ed alle autorità locali che forniscono ulteriori raccomandazioni.

Tubetto da 15 ml



Farmaceutici Procema S.p.A.
Via Mentana 10, 10042
Nichelino (TO)



Beschreibung der Symbole / Description du symbole / Descrizione dei simboli	
	Chargenbezeichnung / Numéro de lot / Numero di lotto
	Verfalldatum/verwendbar bis / Date de péremption/Utiliser avant / Data di scadenza/Utilizzare entro
	Hersteller / Fabricant / Fabricante
	Gebrauchsanweisung beachten – Sie finden darin wichtige Sicherheitshinweise wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. / Consulter les instructions d'utilisation pour connaître les informations importantes telles que les avertissements et les précautions d'emploi. / Consultare le istruzioni per l'uso in merito alle importanti informazioni cautelative, quali avvertenze e precauzioni.
	Gebrauchsanweisung beachten / Consulter la notice / Leggere le istruzioni per l'uso
	Abfall entsorgen / Éliminer conformément aux consignes de tri / Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso
	Artikelnummer / Numéro de référence / Numero di catalogo
	Medizinprodukt / Dispositif Médical / Dispositivo medico
	Eindeutige Produktkennung (Unique Device Identifier) / Identifiant unique du dispositif / Codice UDI

REF

1130963

Neueste Version: Oktober 2022
Dernière version : Octobre 2022
Versione aggiornata: Ottobre 2022

BLOXAPHTE ist ein Warenzeichen der Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer verbundenen Unternehmen.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer verbundenen Unternehmen.

BLOXAPHTE est une marque déposée de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses sociétés affiliées.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated ou ses sociétés affiliées.

BLOXAPHTE è un marchio registrato di Bausch & Lomb Incorporated o delle sue affiliate.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated o le sue affiliate.

BAUSCH + LOMB

1436208
P1DEFRIT02