



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

## Franzbranntwein Menthol

Wirkstoffe: 1,50 g Menthol und 44,10 g Ethanol 96 % (V/V) / 100 g  
Lösung zum Einreiben für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren

### Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Franzbranntwein Menthol und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Menthol beachten?
3. Wie ist Franzbranntwein Menthol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Franzbranntwein Menthol aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist Franzbranntwein Menthol und wofür wird er angewendet?

Franzbranntwein Menthol ist ein Arzneimittel zur Anwendung auf der Haut.

#### Anwendungsgebiet von Franzbranntwein Menthol

Traditionell zur Förderung der Hautdurchblutung, z. B. zur unterstützenden Behandlung von Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen.

Diese Anwendung stützt sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in dem Anwendungsgebiet.

### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Menthol beachten?

#### Franzbranntwein Menthol darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie allergisch gegen Menthol, Ethanol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Patienten mit Keuchhusten, Asthma bronchiale und anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, sowie bei Patienten mit Hauterkrankungen,
- auf offenen Verletzungen, Entzündungen oder Infektionen der Haut sowie auf Ekzemen,
- auf Schleimhäuten sowie im Bereich der Augen,
- bei diabetischer Mikroangiopathie,
- bei peripherer venöser oder arterieller Insuffizienz,
- bei Kindern unter 12 Jahren, da die Konzentration nicht geeignet ist,
- bei Säuglingen und Kleinkindern, da beschrieben ist, dass es in seltenen Fällen zum Atemstillstand bei Glottiskrampf (Verkrampfung der Stimmritze des Kehlkopfs) nach Inhalation ätherischer Öle gekommen ist.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Franzbranntwein Menthol soll nicht mit Hautwunden, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder mit ihren Händen nicht in Kontakt mit Hautpartien gelangen, die mit dem Arzneimittel eingerieben wurden.

Bei Beschwerden, die länger als 3 Tage anhalten oder sich verschlimmern, sollte zur Abklärung der Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit einer Rötung oder einer Schwellung einhergehen, bei andauernden Beschwerden oder bei heftigen Schmerzen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Kinder und Jugendliche

Eine Anwendung von Franzbranntwein Menthol bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren wird nicht empfohlen, da hierfür keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

#### Anwendung von Franzbranntwein Menthol zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Franzbranntwein Menthol sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt geworden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anzuwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Sicherheit einer Anwendung in der Schwangerschaft liegen für den Menschen keine ausreichenden Erfahrungen vor.

Aus Vorsichtsgründen sollte eine Anwendung von Franzbranntwein Menthol während der Schwangerschaft vermieden werden.

Eine großflächige oder über längere Zeit dauernde Anwendung sollte vermieden werden. Um einen direkten Kontakt des Säuglings mit Franzbranntwein Menthol zu vermeiden, darf Franzbranntwein Menthol in der Stillzeit nicht an der Brust angewendet werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei der einmaligen oder kurzzeitigen Anwendung von Franzbranntwein Menthol sind keine besonderen Vorsichtshinweise erforderlich.

#### Franzbranntwein Menthol enthält Ethanol (Alkohol).

Dieses Arzneimittel enthält 1973 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 ml, entsprechend 395 mg/ml.

Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

Bei Neugeborenen (Frühgeborene und termingerechte Geborene) können hohe Ethanol-Konzentrationen aufgrund signifikanter Resorption durch die unreife Haut (insbesondere unter Okklusion) schwere lokale Reaktionen und systemische Toxizität verursachen.

#### Franzbranntwein Menthol enthält Menthol, Eukalyptusöl, Kiefernnadelöl und Rosmarinöl.

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Menthol, Eukalyptusöl, Kiefernnadelöl und Rosmarinöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

#### Franzbranntwein Menthol enthält Eukalyptusöl, Kiefernnadelöl und Rosmarinöl mit D-Limonen, Linalool, Geraniol, Citral, Eugenol und Citronellol.

Dieses Arzneimittel enthält Duftstoffe (Eukalyptusöl, Kiefernnadelöl, Rosmarinöl) mit D-Limonen, Linalool, Geraniol, Citral, Eugenol und Citronellol. Diese können allergische Reaktionen hervorrufen.

### 3. Wie ist Franzbranntwein Menthol anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene beträgt:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Franzbranntwein Menthol 3- bis 5-mal täglich auf die betroffenen Körperpartien dünn aufgetragen und leicht eingerieben. Je nach Größe der zu behandelnden Stelle sind 1 bis 5 ml aufzutragen. Ein Teelöffel entspricht ca. 5 ml.

## Art und Dauer der Anwendung

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht einnehmen!

Vor Anlegen eines Verbandes sollte die Lösung einige Minuten auf der Haut eintrocknen. Von der Anwendung eines luftdichten Verbandes (Okklusivverband) wird abgeraten. Eine zeitgleiche Kryotherapie wird aufgrund der möglichen zusätzlichen Hautreizung nicht empfohlen. Eine großflächige Anwendung wird nicht empfohlen.

Wenden Sie Franzbranntwein Menthol ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4 Tage an.

## Kinder und Jugendliche

Bei Kindern unter 12 Jahren darf Franzbranntwein Menthol nicht angewendet werden (siehe unter Abschnitt 2.).

Eine Anwendung von Franzbranntwein Menthol bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren wird nicht empfohlen, da hierfür keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

Zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen siehe auch Abschnitt 2.

## Wenn Sie eine größere Menge von Franzbranntwein Menthol angewendet haben, als Sie sollten

Wenden Sie Franzbranntwein Menthol nach den Anweisungen des Arztes bzw. nach der in der Packungsbeilage angegebenen Dosierungsanleitung an.

Bei Überschreitung der empfohlenen Dosierung bei der Anwendung auf der Haut sollte die Lösung wieder entfernt und mit Wasser abgespült werden.

Bei topischer Anwendung von wesentlich zu großen Mengen oder versehentlicher Einnahme von Franzbranntwein Menthol ist ein Arzt zu benachrichtigen. Dieser kann entsprechend der Art und Schwere der Beschwerden über die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen entscheiden.

Ein spezifisches Antidot existiert nicht. Auf keinen Fall sollten Milch oder alkoholische Getränke getrunken werden, da dies die Aufnahme von ätherischen Ölen fördern kann.

## Wenn Sie die Anwendung von Franzbranntwein Menthol vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

## Wenn Sie die Anwendung von Franzbranntwein Menthol abbrechen

Das Absetzen von Franzbranntwein Menthol ist in der Regel unbedenklich.

Bei Fortbestehen der Beschwerden befragen Sie Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sollten Sie die folgenden Nebenwirkungen bei sich beobachten, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Arzt, der dann festlegt, wie weiter zu verfahren ist.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1 000 Behandelten
Selten	weniger als 1 von 1 000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten	weniger als 1 von 10 000 Behandelten
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

## Mögliche Nebenwirkungen:

Häufig können lokale Hautreaktionen wie z. B. Hautrötungen, Jucken, Brennen oder Hautausschlag, auch mit Pustel- oder Quaddelbildung, auftreten.

Gelegentlich kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen bzw. lokalen allergischen Reaktionen (Kontaktdermatitis) führen.

Das Einatmen von ätherischen Ölen kann in seltenen Fällen Hustenreiz auslösen.

In sehr seltenen Fällen können bei entsprechendem veranlagten Patienten Atemwegsverengungen (Bronchospasmen) vorkommen.

Der hohe Gehalt an Alkohol kann die Haut austrocknen.

Wenn Franzbranntwein Menthol großflächig auf die Haut aufgetragen und über einen längeren Zeitraum angewendet wird, ist das Auftreten von Nebenwirkungen, die ein bestimmtes Organsystem oder auch den gesamten Organismus betreffen, wie sie unter Umständen nach systemischer Anwendung Menthol-haltiger Arzneimittel auftreten können, nicht auszuschließen.

Beim Auftreten von Hautrötungen, -brennen oder -reizung sind die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser abzuspülen.

Bei Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion soll die Behandlung abgebrochen und Franzbranntwein Menthol nicht nochmals angewendet werden.

## Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Franzbranntwein Menthol aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Vor Feuer schützen! Gut verschlossen lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Franzbranntwein Menthol enthält

- Die Wirkstoffe sind:  
1,50 g Menthol und 44,10 g Ethanol 96 % (V/V) / 100 g
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Eukalyptusöl, Kiefernadelöl, Rosmarinöl, Gereinigtes Wasser

### Wie Franzbranntwein Menthol aussieht und Inhalt der Packung

Franzbranntwein Menthol ist eine klare bis sehr schwach opaleszierende Lösung von artemischem Geruch und in der Packungsgröße zu 500 ml erhältlich.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG  
Industriestr. 6  
52457 Aldenhoven

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2024.**