

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

e l h a t o p

Zusammensetzung:

1 Amp. zu 1 ml enthält

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Acidum arsenicosum Dil. D10 0,091 ml, Aralia racemosa Dil. D4 0,091 ml, Calcium carbonicum Hahnmanni Dil. D15 0,091 ml, Cantharis Dil. D10 0,091 ml, Formica rufa Dil. D10 0,091 ml, Ipecacuanha Dil. D6 0,091 ml, Iodum Dil. D10 0,091 ml, Lobelia inflata Dil. D8 0,091 ml, Natrium carbonicum Dil. D15 0,091 ml, Rhus toxicodendron Dil. D10 0,091 ml, Urtica urens ex herba rec. Dil. D4 (HAB, V. 2a) 0,091 ml

Gemeinsam potenziert über die letzten zwei Stufen.

Darreichungsformen

Originalpackung mit 10 Ampullen (N1)
Originalpackung mit 50 Ampullen (N2)
Originalpackung mit 100 Ampullen (N3)

Pharmazeutischer Unternehmer:

Infirmarius GmbH

Daimlerstraße 19

73037 Göppingen

Telefon 0 71 61 / 6 06 94 - 0

Fax 0 71 61 / 6 06 94 - 90

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer Indikation.
Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Wann dürfen Sie elhatop nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Bei Schilddrüsenerkrankungen.
Beachten Sie bitte die unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise gemachten Angaben.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen Sie beachten?

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist das Arzneimittel sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Was ist bei der Anwendung bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels zur Injektion bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was ist bei der Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Still-

zeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von elhatop?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Wie viel und wie oft sollten Sie elhatop anwenden?

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Beschwerden 2-3mal wöchentlich 2-3 ml i.c., s.c., i.v. oder i.m. injizieren.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1mal 2 ml wöchentlich i.c., s.c., i.v. oder i.m. injizieren.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie elhatop anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von elhatop auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorü-

bergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Flasche und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information:

Dezember 2004