
PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung.
{Eosin Dinatrium}

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ Und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ beachten?
3. Wie ist „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ anzuwenden ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ und wofür wird es angewendet?

ATC-Code : D08AX02

Dieses Arzneimittel ist eine Lösung zur kutanen Anwendung in 5 ml oder 2 ml Einzeldosisflaschen aus Polyethylen mit in Packungen mit 10.

Es wird als ergänzende Behandlung infizierter und/oder eiternder Erkrankungen der Haut und der Schleimhäute verwendet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ beachten?

„WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ darf nicht angewendet werden,

Wenn Sie allergisch gegen Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ anwenden
Um mikrobielle Infektionen zu vermeiden, müssen alle geöffneten Flaschen innerhalb von 48 Stunden

verbraucht werden.
Nicht längerfristig auf ausgedehnten Hautflächen anwenden.
Augenkontakt vermeiden.
Nicht schlucken.
Das Produkt verursacht Flecken auf der Kleidung.

Kinder

Ohne Objekt.

Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Anwendung anderer Lösungen zur kutanen Anwendung (Oxydantien oder Säuren) ist aufgrund des Risikos von Interferenzen zu vermeiden.
Von einem aufeinanderfolgenden Gebrauch anderer Antiseptika wird abgeraten.

Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Ohne Objekt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Stillzeit:

Dank der Abwesenheit von Toxizität kann das wässrige Eosin ohne Beschränkungen auch während der Stillzeit angewendet werden, zumindest in wässriger Lösung. Das wässrige Eosin sollte aber während der Stillzeit nicht auf die Brustwarzen aufgetragen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Ohne Objekt.

„Wässriges Eosin ad 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ enthält

Gereinigtes Wasser.

3. Wie ist „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ anzuwenden

Wenden Sie das wässrige Eosin immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Die übliche Dosierung ist eine ein- bis zweimal tägliche lokale Anwendung mit Hilfe einer sterilen Komresse oder durch direktes Gießen auf die zu behandelnde Stelle.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Wenn Sie eine größere Menge von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ angewendet haben als Sie sollten.

Wenn Sie eine große Menge des Produkts angewendet haben, verständigen Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker oder nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit der Giftnotrufzentrale auf.

Wenn Sie die Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ vergessen haben

Ohne Objekt.

Wenn Sie die Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ abbrechen

Ohne Objekt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen

- Risiko der Lichtempfindlichkeit und lokaler Hautausschläge.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Dieses Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Eine geöffnete Flasche muss innerhalb von 48 Stunden nach dem Öffnen verbraucht werden.

Sie dürfen das Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie Anzeichen von Nichtverwendbarkeit bemerken.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ enthält

- Der Wirkstoff ist: Eosin-Dinatrium.
- Der sonstige Bestandteil ist: gereinigtes Wasser

Wie „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ aussieht und Inhalt der Packung

„WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ ist eine wässrige Eosin-Lösung in einer 5 ml oder 2 ml Einzeldosisflasche aus Polyethylen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoires Gilbert,
928 Avenue du Général de Gaulle,
14200 HEROUVILLE SAINT – CLAIR,
FRANKREICH.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im: 08/2016