

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Hubeactin

Flüssige Verdünnung zur s.c., i.c., i.m., i.v. Injektion

Zusammensetzung:

1 Amp. zu 1 ml enthält

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Arsenum jodatum Dil. D8 0,111 ml, Aurum colloidal
Dil. D10 0,111 ml, Calcium carbonicum Hahnemanni
Dil. D15 0,111 ml, Carbo vegetabilis Dil. D12
0,111 ml, Chininum arsenicosum Dil. D6 0,111 ml,
Graphites Dil. D15 0,111 ml, Lycopodium Dil. D15
0,111 ml, Silicea Dil. D15 0,111 ml, Sulfur joda-
tum Dil. D8 0,111 ml, Bestandteile 1-9 gemeinsam
potenziert über die letzten zwei Stufen.

Darreichungsformen

Originalpackung mit 10 Ampullen (N1)
Originalpackung mit 50 Ampullen (N2)
Originalpackung mit 100 Ampullen (N3)

Pharmazeutischer Unternehmer:

Infirmarius GmbH
Daimlersstraße 19
73037 Göppingen

Telefon 07161 / 6 06 94 - 0
Fax 07161 / 6 06 94 - 90

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer Indikation.

Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Wann darf Hubeactin nicht angewendet werden?

Bei Chininüberempfindlichkeit.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Hubeactin?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Wie viel und wie oft sollten Sie Hubeactin anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-2 mal wöchentlich 1-2 ml i.c., s.c., i.v. oder i.m. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Hubeactin anwenden?

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Hubeactin auftreten?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Flasche und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

In der Originalpackung aufbewahren.

Stand der Information:

Februar 2005