



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Minoxidil Careforsons für Männer 50 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw.

genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Minoxidil Careforsons für Männer und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer beachten?
3. Wie ist Minoxidil Careforsons für Männer anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Minoxidil Careforsons für Männer aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Minoxidil Careforsons für Männer und wofür wird es angewendet?

Minoxidil Careforsons für Männer ist ein

Arzneimittel zum Auftragen auf die Kopfhaut; es stimuliert das Haarwachstum bei Männern im Alter von 18 - 65 Jahren mit männlichem Haarausfall (androgenetische Alopie).

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer beachten?

Minoxidil Careforsons für Männer darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Minoxidil oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- wenn Sie eine Frau sind,
- wenn Sie einen hohen Blutdruck haben (dies gilt auch dann, wenn dieser behandelt wird),
- wenn Ihre Kopfhaut entzündet, infiziert oder gereizt ist oder schmerzt,
- wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die Ihre Kopfhaut beeinträchtigt, einschließlich Sonnenbrand und Psoriasis,
- wenn Sie sich die Kopfhaut rasiert haben,
- wenn auf Ihrer Kopfhaut ein Pflaster oder eine Bandage angebracht ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie die Behandlung mit Minoxidil Careforsons für Männer starten, müssen Sie von Ihrem Arzt gründlich untersucht werden. Bitte sprechen Sie in den folgenden Fällen mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Minoxidil Careforsons für Männer anwenden:

- wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Kopfhaut normal und gesund ist,
- wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden, z. B. Herzrhythmusstörungen und unregelmäßiger Herzschlag, Angina oder Schmerzen im Brustkorb und/oder Kreislaufstörungen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn während der Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer eine der folgenden Situationen auftritt: geringer Blutdruck, Schmerzen im Brustkorb, schneller Herzschlag, Schwächeanfall oder Schwindel, plötzliche Gewichtszunahme, geschwollene Hände oder Füße oder anhaltende Rötung bzw. Reizung der Kopfhaut.

Bei Kleinkindern wurden Fälle von übermäßigem Haarwuchs am Körper nach Hautkontakt mit Minoxidil-Anwendungsstellen von Patienten (Betreuungspersonen), die topisches Minoxidil anwenden, berichtet. Das Haarwachstum normalisierte sich innerhalb von Monaten, wenn die Kleinkinder nicht mehr mit Minoxidil in Kontakt kamen. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit Körperstellen in Berührung kommen, an denen Sie Minoxidil aufgetragen haben. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie während der Anwendung von topischen minoxidilhaltigen Arzneimitteln übermäßigen Haarwuchs am Körper Ihres Kindes feststellen.

Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Arzneimittel und Augen, Mund, verletzter Haut sowie empfindlichen Körperstellen. Falls die Lösung versehentlich auf Bereiche außerhalb der Kopfhaut aufgetragen wird, waschen Sie die betreffenden Stellen mit reichlich Wasser ab. Sprechen Sie bei Bedarf mit Ihrem Arzt.

Der behandelte Bereich darf keinem Sonnenlicht und keinen UV-Lampen (UVA-Licht) ausgesetzt und muss besonders geschützt werden.

Achtung: Lösung und Sprühnebel sind entflammbar. Von Hitze, Funken, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten. Während der Anwendung nicht rauchen. Flasche und Inhalt während der Anwendung, Lagerung und Entsorgung keinen offenen Flammen aussetzen. Flasche dicht geschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort lagern.

Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen bzw. angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen bzw. anzuwenden. Dies gilt insbesondere für verschreibungspflichtige Arzneimittel, wie zum Beispiel:

- Betamethasondipropionat (ein Corticosteroid zur Behandlung von Hautkrankheiten),
- Tretinoin (zur Behandlung von Akne),
- Anthralin (zur Behandlung von Psoriasis),
- Guanethidin (zur Behandlung von hohem Blutdruck).

Minoxidil Careforsons für Männer Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) darf nicht zusammen mit anderen auf die Kopfhaut aufzutragenden Arzneimitteln angewendet werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Minoxidil Careforsons für Männer ist nur für Männer vorgesehen und darf bei Frauen nicht angewendet werden. Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie

schwanger sind oder stillen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Minoxidil Careforsons für Männer kann Schwindel und niedrigen Blutdruck verursachen. Falls diese Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, dürfen Sie kein Fahrzeug führen und keine Maschinen bedienen.

Minoxidil Careforsons für Männer enthält Propylenglycol.

Dieses Arzneimittel enthält 520 mg Propylenglycol pro ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut).

Minoxidil Careforsons für Männer enthält Ethanol (Alkohol).

Dieses Arzneimittel enthält 243 mg Alkohol (Ethanol) pro ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut). Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

3. Wie ist Minoxidil Careforsons für Männer anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Ihr Arzt bestimmt für Sie die geeignete Dosis Minoxidil Careforsons für Männer und die Behandlungsdauer.

Minoxidil Careforsons für Männer ist ausschließlich zum Auftragen auf die Haut vorgesehen. Dieses Arzneimittel darf nicht eingenommen werden. Es darf nur direkt auf der Kopfhaut angewendet werden.

Dieses Arzneimittel darf nur auf gesunder

Kopfhaut und nicht auf andere Körperstellen aufgetragen werden. Es darf nicht auf entzündeter, infizierter, gereizter oder schmerzender Kopfhaut angewendet werden.

Tägliche Dosis für erwachsene Männer im Alter von 18 - 65 Jahren

Die empfohlene Tagesdosis beträgt 1 ml Lösung zweimal täglich (10 Sprühstöße mittels Dosierpumpe entsprechen 1 ml Lösung).

Unabhängig vom Ausmaß des Haarausfalls darf stets nur die empfohlene Tagesdosis angewendet werden.

- Vor dem ersten Gebrauch die Schutzkappe von der Flasche abschrauben und durch die Dosierpumpe ersetzen. Die Dosierpumpe gut festschrauben.
- Vor der Anwendung Hände gründlich mit Wasser waschen.
- Haare und Kopfhaut müssen vor der Anwendung vollkommen trocken sein.
- Eine 1 ml-Dosis (10 Sprühstöße mittels Dosierpumpe) auf den gesamten Bereich auftragen und dabei von der Mitte des zu behandelnden Bereichs beginnen.
- Lösung mit Fingerspitzen sanft in die Kopfhaut einmassieren.
- Nach der Anwendung von der Lösung Hände gründlich mit Wasser waschen.



Falls die Lösung versehentlich mit Körperstellen außerhalb der Kopfhaut in

Kontakt kommt, betroffene Bereiche mit reichlich Wasser abwaschen.

Fortlaufende Behandlung mit Minoxidil Careforsors für Männer Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut)

Dieses Arzneimittel muss in der Regel mindestens zwei Monate lang zweimal täglich angewendet werden, bevor sich neuer Haarwuchs einstellt, da das Haarwachstum ein langsamer Prozess ist.

Neu wachsende Haare können zunächst weich und flaumig sein, nehmen aber im Laufe der Zeit normalerweise dieselbe Form an wie normales Haar. Nach dem Absetzen dieses Arzneimittels können neue Haare 3–4 Monate später wieder ausfallen und die Glatzenbildung bzw. der Haarausfall sich fortsetzen. Die fortlaufende Behandlung ist nötig, um das Wachstum neuer Haare zu fördern und aufrechtzuerhalten, da der Haarausfall sonst wieder anfängt.

Falls sich der Haarwuchs nach 4 Monaten nicht bessert, sollte die Behandlung abgesetzt werden.

Wenn Ihnen während der Behandlung etwas Sorge bereitet, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Anwendung bei Frauen

Minoxidil Careforsors für Männer darf bei Frauen nicht angewendet werden.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen
Minoxidil Careforsors für Männer darf bei Patienten unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung bei Patienten über 65 Jahren
Minoxidil Careforsors für Männer darf bei Patienten über 65 Jahren nicht angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Minoxidil

Careforsors für Männer angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Minoxidil Careforsors für Männer angewendet haben, als Sie sollten, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt oder Apotheker.

Eine versehentliche oder beabsichtigte Überdosis nach der Anwendung von Minoxidil kann hautbezogene Nebenwirkungen verstärken, insbesondere Juckreiz (Pruritus), Trockenheit, Reizung und Ekzem (akute oder chronische entzündliche Hautkrankheit).

Eine versehentliche Einnahme kann schwerwiegende Herzprobleme verursachen. Anzeichen und Symptome einer versehentlichen oder beabsichtigten Einnahme von Minoxidil umfassen u. a. niedrigen Blutdruck (Hypotonie), Herzrasen (Tachykardie), Schwellungen bzw. Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) und Herzversagen (kongestive Herzinsuffizienz).

Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil Careforsors für Männer vergessen haben
Zu Beginn der Behandlung: Tragen Sie die vergessene Dosis so bald wie möglich auf und folgen Sie anschließend den Empfehlungen Ihres Arztes. Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Im Erhaltungszeitraum: Fahren Sie so fort, als ob Sie die Anwendung nicht vergessen hätten. Tragen Sie die nächste Dosis wie gewohnt auf und setzen Sie die Behandlung fort.

Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil Careforsors für Männer abbrechen
Nach dem Absetzen der Behandlung kann der Haarwuchs aufhören und die Alopezie innerhalb von 3 – 4 Monaten zurückkehren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen verursachen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Falls Sie bei sich eines der folgenden Symptome bemerken, informieren Sie bitte unverzüglich einen Arzt, da Sie in einem solchen Fall möglicherweise dringend medizinische Hilfe benötigen:

- Schwellung des Gesichts, der Lippen oder des Halses, die das Schlucken oder Atmen erschwert; dies könnte ein Anzeichen für eine schwere allergische Reaktion sein (Häufigkeit nicht bekannt und auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar),
- geschwollene Hände oder Füße (häufig),
- anhaltende Rötung, Ausschlag oder Reizung der Kopfhaut (nicht bekannt),
- Schwächeanfall oder Schwindel (gelegentlich),
- rascher oder unregelmäßiger Herzschlag (selten),
- Schmerzen im Brustkorb (selten),
- niedriger Blutdruck (nicht bekannt),
- plötzliche unerklärliche Gewichtszunahme (häufig).

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen):

- Kopfschmerzen

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen):

- juckende Haut oder Ausschlag,
- übermäßiger Haarwuchs,
- Kurzatmigkeit bzw. Atemnot.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

- Übelkeit

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- Reizung der Augen (einschließlich juckende Augen),
- Erbrechen,
- veränderte Farbe und/oder Beschaffenheit der Haare,
- in den ersten 2-6 Behandlungswochen kann es zu einem vorübergehenden Haarausfall kommen; dieser ist wahrscheinlich auf eine Änderung des Wachstumszyklus zurückzuführen und müsste nach wenigen Wochen wieder abklingen. Wenn die Haare länger als zwei Wochen lang ausfallen, setzen Sie dieses Arzneimittel ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Reaktionen an der Applikationsstelle wie Juckreiz, Irritation, Schmerzen, Ausschlag, Schwellung, trockene Haut und Rötung von Kopfhaut, Ohren und Gesicht, gelegentlich auch schwerere Reaktionen wie Abschälung, Dermatitis, Bläschen, Blutungen und Geschwüre),
- depressive Verstimmung

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn Website: <http://www.bfarm.de>. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Minoxidil Careforsors für Männer aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Dieses Arzneimittel darf nach dem auf dem Umkarton und der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwendet werden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

Achtung: Lösung und Sprühnebel sind entflammbar. Von Hitze, Funken, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten. Während der Anwendung nicht rauchen. Flasche und Inhalt während der Anwendung, Lagerung und Entsorgung keinen offenen Flammen aussetzen. Flasche dicht geschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Minoxidil Careforsors für Männer enthält

- Der Wirkstoff ist Minoxidil. Jeder Milliliter (ml) Lösung enthält 50 mg Minoxidil. 1 ml entspricht 10 Sprühstößen.
- Die sonstigen Bestandteile sind Ethanol 96 %, Propylenglycol und gereinigtes Wasser.

Wie Minoxidil Careforsors für Männer aussieht und Inhalt der Packung

Minoxidil Careforsors für Männer Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) ist eine durchsichtige, farblose bis leicht gelbliche Lösung mit Alkoholgeruch. Das Arzneimittel ist in den folgenden Packungsgrößen erhältlich: 60 ml, 120 ml (2 Flaschen mit je 60 ml), 180 ml (3 Flaschen mit je 60 ml) und 240 ml (4 Flaschen mit je 60 ml) mit einer Sprühpumpe. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Careforsors Ireland Limited
Hamilton House
28 Fitzwilliam Place
Dublin 2
D02 P283
Irland

Hersteller

Industrial Farmacéutica Cantabria S.A.
Ctra. de Cazona-Adarzo, s/n
39011 SANTANDER
Spanien

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im **Oktober 2024**.