

Mucosan®

LUTSCHTABLETTEN

Lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch, bevor Sie mit der Anwendung von Mucosan® Lutschtabletten beginnen. WERFEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG NICHT WEG! Sie enthält wichtige Informationen. Wenn Sie Fragen zu Mucosan® Lutschtabletten haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt, Ihre Apotheke oder den Vertreiber.

Was sind Mucosan® Lutschtabletten und wofür werden sie angewendet?

Mucosan® Lutschtabletten sind ein Medizinprodukt, das Ectoin® enthält, ein natürliches zellschützendes Molekül mit entzündungsreduzierenden und membranstabilisierenden Eigenschaften.

Mucosan® Lutschtabletten sind Lutschtabletten mit einem angenehmen Kirsch- und Waldbeeregeschmack zur Behandlung und Prävention von Symptomen bei Erkältungskrankheiten, Mund- und Halstrockenheit und bei Heiserkeit.

Mucosan® Lutschtabletten bilden einen Schutzschild mit der Bezeichnung „Ectoin® Hydro Komplex“ auf den Schleimhäuten in Mund und Rachen. Sie stabilisieren die Membranen und reduzieren so die Gefahr einer bakteriellen oder viralen Infektion in Mund und Rachen.

Mucosan® Lutschtabletten erhöhen die Speichelproduktion und reduzieren Entzündungen der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum. Dadurch verringern Mucosan® Lutschtabletten die Symptome einer akuten Pharyngitis, wie Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit. Außerdem hydratisieren Mucosan® Lutschtabletten trockene und gereizte Schleimhäute und unterstützen deren Regeneration. Reizungen der Schleimhäute, wie z.B. Ermüdung der Stimme, Halsreizung oder Trockenheit durch Übergebrauch der Stimme, Allergene oder trockene Luft, wie z.B. durch Heizen, kalte Luft, Klimaanlage oder Rauch, können verhindert und reduziert werden.

Mucosan® Lutschtabletten lindern Reizungen der Schleimhäute sowie den Hustenreiz. Sie lindern erste Symptome wie Heiserkeit, trockenen Husten und Halsschmerzen und verhindern eine Verschlechterung. Daher wird empfohlen, mit der Anwendung bei den ersten Anzeichen einer Erkältung zu beginnen. Darüber hinaus unterstützen die Lutschtabletten die freie Atmung und sind zuckerfrei. Die Wirkung von Mucosan® Lutschtabletten basiert zu 100 % auf natürlichen Inhaltsstoffen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Mucosan® Lutschtabletten sollten nicht bei bestehenden Traumata, z.B. nach einer Operation oder nach Mundverletzungen, angewendet werden.
- Mucosan® Lutschtabletten dürfen bei Überempfindlichkeit gegen Ectoin® oder einen der sonstigen Bestandteile der Lutschtabletten nicht verwendet werden.
- Wenn allergische Reaktionen auftreten, muss die Anwendung von Mucosan® Lutschtabletten sofort abgebrochen werden.
- Kinder unter 6 Jahren sollten Mucosan® Lutschtabletten wegen der Gefahr des Erstickens nicht anwenden.
- Wegen der Gefahr des Erstickens, dürfen die Lutschtabletten nicht im Liegen, z. B. vor dem Schlafengehen, angewendet werden.
- Verwenden Sie keine Lutschtabletten in beschädigten oder durchstochenen Blistern.
- Mucosan® Lutschtabletten sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Was Sie vor der Anwendung von Mucosan® Lutschtabletten beachten sollten

Es liegen keine Daten zu Wechselwirkungen zwischen Mucosan® Lutschtabletten und anderen Lutschtabletten oder Medizinprodukten vor. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, wenn Sie Mucosan® Lutschtabletten anwenden, bevor Sie ein anderes Medizinprodukt oder Arzneimittel im Mund anwenden.

Wie sind Mucosan® Lutschtabletten anzuwenden

Lösen Sie alle drei Stunden 1 Lutschtablette langsam im Mund auf oder so oft wie erforderlich. Nicht mehr als 10 Lutschtabletten pro Tag anwenden.

Mögliche Nebenwirkungen von Mucosan® Lutschtabletten

Mucosan® Lutschtabletten werden gut vertragen. Bisher sind keine regelmäßig auftretenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt. Bei übermäßiger Anwendung kann eine leicht abführende Wirkung aufgrund des Bestandteils Isomalt sehr selten auftreten. Bitte informieren Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder den Vertreiber, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die mit der Anwendung von Mucosan® Lutschtabletten in Zusammenhang stehen. Wenn der Zustand anhält oder sich verschlechtert, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie sind Mucosan® Lutschtabletten aufzubewahren?

Mucosan® Lutschtabletten sollten zwischen 2 °C und 25°C an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Das Verfallsdatum der Mucosan® Lutschtabletten ist auf der Faltschachtel und auf der Blisterpackung aufgedruckt. Mucosan® Lutschtabletten dürfen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Zusätzliche Informationen:

Derzeit liegen keine Daten zur Verwendung von Mucosan® Lutschtabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie dieses Medizinprodukt anwenden, wenn Sie:

- schwanger sind oder stillen
- nicht sicher sind, ob Sie schwanger sind oder nicht.

Inhalt von Mucosan® Lutschtabletten

2 Blister mit 8 Lutschtabletten.

Bestandteile

Ectoin®, Isomalt, Sucralose, Citronensäure, Kirscharoma, Waldbeerenaroma, schwarze Maulbeerenaroma, Anthocyanin (schwarze Karotte), Wasser.

Hersteller:

 bitop AG
Stockumer Str. 28
58453 Witten, Deutschland

Vertrieb durch:

A. Nattermann & Cie. GmbH
Brüningstraße 50
65929 Frankfurt
Deutschland



Stand der Informationen Mai 2025



CE Kennzeichen



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



An einem trockenen Ort lagern



Chargennummer



Verfallsdatum
Mindestens
haltbar bis



Bei 2° C bis 25° C lagern

151.06.939563