Gebrauchsinformation

Bitte aufmerksam lesen!

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Bei Fragen oder auftretenden Nebenwirkungen holen Sie bitte therapeutischen Rat ein.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Wulf Rabe's Biologische Mittel
adjupharm GmbH
Lily-Braun-Straße 48
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 04531-679276
Fax: 04531-679323
Email: info@adjupharm.de
www.wulf-rabe.de

Parabenzochinon Ampullen

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 2 ml (= 2 g) enthält:
Parabenzochinon D 6 aquos. 2 ml (= 2 g)

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Packungsgrößen:

10 Ampullen (N1) mit je 2 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion oder zum Einnehmen.
40 Ampullen (N2) mit je 2 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion oder zum Einnehmen.

Anwendungsgebiete:

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer Indikation

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei bekannter Allergie gegen den Inhaltsstoff Parabenzochinon D 6 aquos.!
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollten „Parabenzochinon Ampullen" in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Die i.m. Injektion ist schmerzhaft; mögliche Ausnahme: Procain®-Zusatz. Nach Mischung der in einer
5 ml-Spritze aufgezogenen Injektionslösung mit mindestens 3 ml Blut, erfolgt diese Injektion (am besten in den M. glutaeus max.) nahezu schmerzfrei.
Ansonsten sollten die Parabenzochinon-Ampullen nicht mit anderen Arzneilösungen gemischt werden.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten.

Gebrauchsinformation

Bitte aufmerksam lesen!

Empfehlung:

Die Dosierung und Art der Anwendung sollte immer mit einem in der „Koch´schen Molekulartherapie“ erfahrenen Therapeuten abgesprochen werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, erhalten Erwachsene bei **akuten Beschwerden** einmal täglich 1 Ampulle, intramuskulär (i.m.) oder subcutan (s.c.) injiziert oder peroral verabreicht.

Kinder über 7 Jahre erhalten bei akuten Zuständen 1 Ampulle (2 ml) peroral, jüngere Kinder erhalten eine halbe Ampulle (1 ml) peroral, jeweils einmal täglich, möglichst 30 Min. **unverdünnt** vor dem Frühstück, bis die akuten Beschwerden abgeklungen sind.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei **chronischen Verlaufsformen** erhalten Erwachsene 1 Ampulle zu 2 ml im Abstand von 4 – 14 Tagen i.m. oder s.c. injiziert, bis zu insgesamt 5 – 30 Injektionen. Bei schon sehr lange bestehenden chronischen Beschwerden können insgesamt 40 – 80 Injektionen im Abstand von 7 – 28 Tagen erfolgen. Erst nach Abklingen einer Reaktion kann unter Verdopplung des zuletzt gewählten Intervalls die Injektionsserie fortgesetzt werden. Auch eine Langzeittherapie über 5 – 10 Jahre mit einer Injektion im Abstand von 14 – 28 Tagen kann bei schwer chronischen Beschwerden gefahrlos durchgeführt werden.

Gleiches gilt für die perorale Anwendung bei Kindern (1 ml oder 2 ml altersentsprechend): Ampulleninhalt **unverdünnt** am besten 30 Min. vor dem Frühstück, evtl. mit einem Strohhalm, trinken oder direkt auf die Zunge tropfen.

Hinweise:

Auch homöopathische Arzneimittel sollen ohne ärztlichen Rat nicht über eine längere Zeit angewendet werden.

Wechsel- und Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn

anzeigen.
Website: www.bfarm.de

Hinweis:

Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie dies bitte Ihrem Therapeuten mit.

Hinweise zur Haltbarkeit von Arzneimitteln:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Lagerhinweise:

Trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur lagern!

Apothekenpflichtig.

Stand der Information: 07.2020

adjupharm
Tradition Innovation Vertrauen

SEIT 1920 WOLF RABE'S BIOLOGISCHE MITTEL

KM03-BZ