

silicolgel®

Kolloidale Kieselsäure gegen Magen-Darm-Erkrankungen

Zur Behandlung von:

- Sodbrennen
- Reflux, saurem Aufstoßen
- Erbrechen

Und Reizdarmsymptomen (IBS):

- Übelkeit
- Blähungen
- Bauchschmerzen
- Unbestimmte Bauchbeschwerden
- Durchfall



silicolgel enthält Kieselsäure aus dem Mineralstoff Silicium und Sauerstoff in kolloidaler (feinstverteilter) und wasserhaltiger Form.

Silicium, nach Sauerstoff das zweithäufigste Element, kommt in der Natur als Siliciumdioxid und in Verbindung mit Wasser als Kieselsäure vor.

Magen-Darm-Erkrankungen werden häufig durch Schad-, Reiz- und Giftstoffe sowie Krankheitserreger verursacht. Wenn der Magen-Darm-Trakt durch solche Giftstoffe und Krankheitserreger gestört ist, kann es sowohl zu Sodbrennen, Reflux (saurem Aufstoßen) und Erbrechen als auch zu Übelkeit, Blähungen, Bauchschmerzen, unbestimmten Bauchbeschwerden und Durchfall kommen, die die Symptome eines Reizdarmsyndroms sein können. So kann der Verdauungstrakt seine wichtigen Funktionen nicht ungestört ausführen und es tritt körperliches Unwohlsein auf.

Der Vorteil von **silicolgel** besteht in der großen und reaktionsfähigen Oberfläche der Kieselsäure, wodurch sich bei innerlicher Anwendung eine schützende und damit beruhigende Schicht auf der Magen- und Darmschleimhaut bildet. Aufgrund des Bindungsvermögens kolloidaler Kieselsäure werden Schad-, Reiz- und Giftstoffe sowie Krankheitserreger im Magen-Darmbereich physikalisch adsorbiert (gebunden) und unschädlich gemacht, so dass sie auf natürlichem Wege über den Darm ausgeschieden werden können.

Kieselsäure kann auch übermäßige Säure reduzieren und Gase binden. Dies kann Flatulenz (Blähungen) reduzieren.

ANWENDUNGSHINWEISE:

- **Die Flasche vor jedem Gebrauch gut schütteln.**
- **silicolgel** soll mit mindestens 1 Stunde Abstand vor oder nach der Einnahme von Medikamenten eingenommen werden.

Bei Magen-Darm-Erkrankungen 1 Esslöffel (15 ml) **silicolgel** 3-mal pro Tag 1 Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen.

Kinder unter 12 Jahren sollten **silicolgel** nur nach ärztlicher Anweisung verwenden.

silicolgel kann unverdünnt oder verdünnt mit Wasser eingenommen werden.

Nach Abklingen der akuten Beschwerden kann die Behandlung noch einige Tage fortgesetzt werden.

Wenn ähnliche Beschwerden im Magen-Darm-Trakt bei ungewohnter Kost, bei Nahrungsumstellung im Urlaub oder auf Reisen auftreten, ist **silicolgel** auch hilfreich.

Falls die akuten Beschwerden sich verschlechtern oder nach 3 Tagen nicht abgeklungen sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Es ist notwendig, bei Durchfallerkrankungen den Flüssigkeitsverlust durch Trinken auszugleichen.

Bei chronischen Beschwerden empfehlen wir eine Behandlung von bis zu 4 Wochen.

silicolgel ist für Vegetarier und Veganer geeignet. Glutenfrei.

ZUSAMMENSETZUNG:

3,5 g Siliciumdioxid in 100 ml Kieselsäuregel, Konservierungsstoffe: Sorbinsäure (E 200), Natriumbenzoat (E 211).

NEBENWIRKUNGEN:

Keine Nebenwirkungen bekannt.

WECHSELWIRKUNGEN:

silicolgel soll mit mindestens 1 Stunde Abstand vor oder nach der Einnahme von Medikamenten eingenommen werden, da ansonsten deren Wirksamkeit durch das Bindungsvermögen der Kieselsäure beeinträchtigt werden könnte.

GEGENANZEIGEN:

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht verwendet werden.

HINWEISE:

- Die Flasche für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die Flasche vor Frost schützen. Über 2 °C lagern.
- Die Flasche vor jedem Gebrauch gut schütteln.
- Die Gebrauchsanweisung beachten!
- Nur bis zum Verwendbarkeitsdatum verwenden.
- Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.



DARREICHUNGSFORM:

Gel zum Einnehmen.

INHALT:

200 ml oder 500 ml in der Flasche.

STAND DER INFORMATION:

August 2020

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND:

Silicol GmbH, Teltower Straße 10, D-33719 Bielefeld

CE
0297