

GEBRAUCHSINFORMATION

Simeticon Dechra

41,2 mg/ml

Tropfen zur oralen Gabe für
Hauskaninchen und Kleinnager

NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
Hauptstraße 6 - 8

88326 Aulendorf

Deutschland

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Biokanol Pharma GmbH

Kehler Straße 7

76437 Rastatt

Deutschland

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Simeticon Dechra 41,2 mg Simeticon/ml

Suspension, Tropfen zur oralen Gabe für

Hauskaninchen und Kleinnager

Simeticon

WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff: Simeticon (Dimeticon und Siliciumdioxid
im Verhältnis 97:3) 1 ml (= 22 Tropfen) enthält 41,2 mg
Simeticon

Sonstige Bestandteile: Bananen-Aroma 1 ml
(= 22 Tropfen) enthält 41,2 mg Simeticon
milchig-trübe, zäflüssige Suspension mit Geruch
und Geschmack nach Banane.

ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Übermäßige, auch feinschaumige Gasbildung im Magen-Darm-Bereich etwa verursacht durch mikrobielle und parasitäre Infektionen, Futtermittelunverträglichkeit und Fehlernährung.
- Verstärkte Gasbildung nach Narkosen und Operationen
- Hilfsmittel zur Diagnostik im Bauchbereich (Röntgen, Sonografie, Endoskopie).

GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

ZIELTIERART(EN)

Hauskaninchen und Kleinnager.



Dechra

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Schmackhafte Suspension zum Eingeben.
Hauskaninchen und Kleinnager: 33 - 44 Tropfen/kg
Körpergewicht (entspr. 1,5 - 2 ml/kg Körpergewicht)
3 bis 6 mal täglich vorzugsweise direkt in den Mund
des Tieres oder über das Trinkwasser verabreichen.
Die Anwendung erfolgt in der Regel über einen bis
mehrere Tage bzw. solange die Beschwerden
bestehen.

Simeticon Dechra kann bei Bedarf auch über
längere Zeit verabreicht werden.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Hinweise für die richtige Anwendung: Flasche vor
Gebrauch gut schütteln.

Zur Entnahme der Suspension Verschlusskappe
abdrücken.

Zum Tropfen wird die Flasche auf den Kopf gedreht
und senkrecht gehalten.

Bei Eingabe den Kopf des Tieres nicht hochhalten,
damit es gut abschlucken kann.

Flasche nach Entnahme verschließen.

WARTEZEIT(EN)

Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der
Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Nicht über 25 °C lagern. Nach dem Öffnen 3 Monate
haltbar. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf
Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen
Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Nicht zutreffend.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind
vorzugsweise bei Schadstoffsammlstellen
abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem
Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein
missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen
kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem
Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

WEITERE ANGABEN

Braunglasflasche mit 30 ml Inhalt im Faltkarton.

SJ210907



Dechra