

## **Gebrauchsinformation**

### **Aspecton® Junior Hustenstiller Isländisch Moos**

Für Kinder ab 1 Jahr

#### **Liebe Patientin, lieber Patient,**

bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Was ist in Aspecton® Junior Hustenstiller enthalten?**

100 ml Flüssigkeit enthalten 11,12 g Flüssigextrakt aus Lichen islandicus (1:1)

##### Sonstige Bestandteile:

Kaliumsorbat, Maltitol-Lösung, Citronensäure wasserfrei, Hydroxyethylcellulose, Macrogolglycerolhydroxystearat, Propylenglykol, Sucralose, Honigaroma, gereinigtes Wasser.

alkohol-, zucker-, gluten- und lactosefrei

#### **Wann wird Aspecton® Junior Hustenstiller angewendet?**

Aspecton® Junior Hustenstiller ist ein Sirup zur Anwendung bei Schleimhautreizungen im Mund und Rachenraum und damit verbundenem trockenem Reizhusten.

Die Inhaltsstoffe des Isländisch Moos (Lichen islandicus) legen sich schützend über die Mund- und Rachenschleimhaut. Die beanspruchte Schleimhaut wird dadurch vor äußeren Reizen geschützt, und der Entstehung des Hustens wird vorgebeugt.

Die reizlindernde Wirkung wird durch den hohen Anteil an Schleimstoffen im Isländisch Moos-Extrakt erzielt. Diese verhindern ein Austrocknen der Schleimhäute durch Binden von Wasser an der Oberfläche.

#### **Wann ist bei der Anwendung von Aspecton® Junior Hustenstiller Vorsicht geboten?**

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe darf Aspecton® Junior Hustenstiller nicht angewendet werden.

Aspecton® Junior Hustenstiller ist nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.

Dieses Medizinprodukt enthält Maltitol-Lösung. Bitte nehmen Sie Aspecton® Junior Hustenstiller erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

10 ml enthalten 3,43 g Maltitol entsprechend ca. 0,29 Broteinheiten. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol. Maltitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Macrogolglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.


Zur Anwendung dieses Medizinproduktes in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollte die Anwendung von Aspecton® Junior Hustenstiller in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

### **Wie wird Aspecton® Junior Hustenstiller angewendet?**

Kinder von 1 – 4 Jahren nehmen 1- bis 2-mal täglich 5 ml, Kinder von 5 – 10 Jahren 2-mal täglich 10 ml und Kinder und Jugendliche von 11 – 16 Jahren 3- bis 4-mal täglich 10 ml ein.

Der Packung liegt eine Dosierspritze zur genauen Dosierung bei.

Hinweise zur Anwendung der Dosierspritze:



1. Stecken Sie die Dosierspritze in die geöffnete Flasche, und drücken Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt. Der Spritzenkolben soll dabei bis zum Anschlag in der Spritze stecken.
2. Drehen Sie die Flasche vorsichtig auf den Kopf, und ziehen Sie mit der Dosierspritze langsam die Flüssigkeit auf, indem Sie den Spritzenkolben bis zur gewünschten Markierung herausziehen.
3. Drehen Sie die Flasche wieder herum, und ziehen Sie die Spritze durch behutsames Drehen aus dem Flaschenhals. Verschließen Sie die Flasche wieder nach Entnahme.
4. Verabreichen Sie den Sirup entweder direkt mit der Spritze, indem Sie die Spritze langsam gegen die Innenseite der Wange entleeren oder auf einem Löffel.
5. Ziehen Sie nach der Anwendung den Kolben aus dem Spritzenzylinder, reinigen die Teile mit warmem Wasser und trocknen Sie die Spritze anschließend.

#### Hinweis für Diabetiker:

10 ml entsprechen 0,29 BE.

Unmittelbar nach der Einnahme von Aspecton® Junior Hustenstiller sollten Sie nicht essen oder trinken, weil das Produkt sonst eventuell wieder zu schnell von der Mund- und Rachenschleimhaut entfernt wird.

### **Wie lange dürfen Sie Aspecton® Junior Hustenstiller anwenden?**

Falls die Beschwerden länger als 3 Tage ohne Besserung bestehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Welche Hinweise zur Haltbarkeit und Lagerung sind zu beachten?**

Das Verfalldatum der ungeöffneten Flasche ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch der Flasche ist das Produkt 6 Monate verwendbar.

Nicht über 25 °C lagern.

### **In welchen Packungsgrößen ist Aspecton® Junior Hustenstiller erhältlich?**

Aspecton® Junior Hustenstiller ist in Flaschen mit 100 ml erhältlich.

Der Packung ist jeweils eine Dosierspritze beigelegt (Kennzeichnung des Medizinproduktes CE 0120).

### **Hersteller**

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstr. 2, 53783 Eitorf  
Telefon: 02243 / 87-0, Telefax: 02243 / 87-175  
E-Mail: info@krewelmeuselbach.de

### **Stand der Information:**

März 2016

[CE-Kennzeichnung]

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**