

Alleinfuttermittel für Kälber

Diätfuttermittel zur Regulation der Darmfunktion



Blatt 65b

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Telefon 0 18 03/660 660

 **Boehringer
Ingelheim**

Diakur® Plus

Bezeichnung des Futtermittels

Diakur® Plus

Alleinfuttermittel für Kälber
Diätfuttermittel zur Regulation der
Darmflora

Zusammensetzung

Glucose (57 %), Zitrustrester (15 %),
Natriumchlorid (5 %), Hefe (2 %),
Kaliumchlorid (2 %)

Gehalt an Inhaltsstoffen

Rohprotein	3,2 %
Rohfett	5,6 %
Rohfaser	2,5 %
Rohasche	13,6 %
Natrium	4,2 %
Kalium	1,1 %

Zusatzstoffe

Lecithin, Natriumbicarbonat, Silicium-
dioxid, Natriumacetat, Natriumcitrat,
Glycin, Xanthan als Stabilisator, natürliche
und naturidentische Geschmacksstoffe,
Antioxidans (Ethoxyquin 60 ppm)

Eigenschaften

Diakur® Plus entsorgt die im Darm befindlichen Durchfallerreger und versorgt das Kalb mit lebensnotwendigen Elektrolyten und Puffersubstanzen. Der in Diakur® Plus vorhandene Citrustrester ist mit einer Lecithinschicht versehen, die den Partikeln hydrophobe Eigenschaften verleiht (kein kosmetisches Quellen). Pathogene Keime – vor allem E. Coli – verbinden sich bevorzugt mit diesen Partikeln und werden mit dem Kot ausgeschieden. Die in Diakur® Plus enthaltenen Mannanoligosaccharide aus Hefezellen verfügen über zusätzliche Bindungskapazitäten.

Weiterhin versorgt Diakur® Plus das Kalb mit Energie und Elektrolyten. Dabei wurde die Rezeptur an die neuesten Erkenntnisse angepasst. Das Kalb wird schnell rehydriert, weil mit Diakur® Plus die optimale Osmolarität im Verdauungstrakt eingestellt wird. Der in Diakur® Plus enthaltene „Drei-Phasen-Puffer“ enthält Natriumbicarbonat, das sofort der Acidose entgegenwirkt. Später wird aus Natriumacetat und Natriumcitrat weiteres Bicarbonat zur Langzeitacidosevermeidung frei. Der Gehalt an Natriumbicarbonat ist in Diakur® Plus so angepasst worden, dass die Milchgerinnung nicht beeinträchtigt wird und ein Vertränken mit Milch bzw. Milchaustauscher problemlos möglich ist.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Für 50 kg schwere Kälber je 100 g Diakur® Plus (1 Beutel oder 2 Messbecher) in 2 Liter 35 – 40 °C warmem Wasser, Milch oder Milchaustauscher anrühren. Unmittelbar nach dem Anrühren verfüttern. Diese Tränke 3-mal täglich verabreichen. In den meisten Fällen haben sich die Darmfunktionen nach 24 Stunden stabilisiert. In Ausnahmefällen kann die Diakur®-Tränke weitere 24 Stunden (wiederum 3 x 2 Liter) verabreicht werden. Bei Bedarf kann Diakur® Plus auch mit der Milch bzw. dem Milchaustauscher vertränkt werden. Nützlich ist ein zusätzliches Angebot zwischen den Mahlzeiten.

Treten nach 48 Stunden noch Durchfallerscheinungen auf, ist auf jeden Fall der Tierarzt hinzuzuziehen.

Lagerhinweise

Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordnungsgemäße Aufbewahrung voraus. Dazu gehört insbesondere trockene Lagerung.

Diakur® Plus

Packungsgrößen

Box mit 24 Beuteln zu 100 g
Eimer mit 3 kg
Eimer mit 10 kg

Datum der Information

April 2009

Vertreibender Unternehmer

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim