

FLUXAN

LIQUID

MEDIZINPRODUKT CE0426

- Verringert gastroösophagealen Reflux
- Lindert Übersäuerung
- Schützt die Magenschleimhaut

1. Kennzeichnung, Zusammensetzung und Anwendung

FLUXAN dient der Behandlung und Vorbeugung von gastroösophagealem Reflux, brennendem Gefühl, Magenübersäuerung und dem Schutz der Schleimhäute in Magen und Speiseröhre.

FLUXAN ermöglicht die Kontrolle einer Übersäuerung des Magens und beugt Brennen, Magenschmerzen und damit zusammenhängenden Verdauungsbeschwerden vor.

FLUXAN wirkt unabhängig von der Ursache der Beschwerden; darüber hinaus kann es als Adjuvans bei Gastritis eingesetzt werden.

1.1 Wirkungsmechanismus

FLUXAN enthält eine Kombination verschiedener synergistischer Substanzen, die im Magenumfeld wirken.

Alginat ist ein besonderes Polysaccharid, das aus bestimmten Algenarten isoliert wird.

Nachdem dieser Ballaststoff die saure Magen Umgebung erreicht hat, bewirkt er sehr schnell die Bildung eines viskösen und leichten Gels, das die Magenschleimhaut bedeckt und schützt. Die besondere Rezeptur mit Natriumalginat, Alginsäure und Bicarbonat ermöglicht eine beschleunigte Wirkung.

Außerdem erschwert das visköse Alginat-Gel das Aufsteigen von Magensäure und verringert somit die Häufigkeit von Reflux-Episoden. Die Kombination aus Carbonat und Bicarbonat neutralisiert die Magensäure. Darüber hinaus werden die sich bei der Reaktion bildenden Kohlendioxidblasen durch das Alginat-Gel aufgefangen, wobei das Gel in einen Schaum umgewandelt wird, der auf der Oberfläche der Magensäfte schwimmt.

1.2 Bestandteile

Natriumalginat, Calciumcarbonat, Kaliumbicarbonat.

Hilfsstoffe:

Ingwerextrakt (Aroma), ätherisches Ingweröl (Aroma), Anis- und Milcharomen, Wasser, Carbomer, Natrium-methyl-para-hydroxybenzoat, Sucralose.

2. Verpackung

Eine Packung enthält 20 Sachets.

3. Dosierung und Anwendung

Erwachsene und Jugendliche (12–18 Jahre):

Die empfohlene Dosierung ist 3 Sachets pro Tag, die für mindestens 2 Wochen unmittelbar nach jeder Hauptmahlzeit und 1 Sachet vor dem Schlafengehen eingenommen werden, bis die Symptome behoben sind. Falls die Beschwerden nach einem Monat der Anwendung des Produktes anhalten, konsultieren Sie einen Arzt.

Diese Dosierung ist wirksam gegen Übersäuerung des Magens und zur Vermeidung von gastroösophagealem Reflux (Sodbrennen und saures Aufstoßen). Die angegebene Dosis darf nicht überschritten werden.

4. Nebenwirkungen

Bei der Dosis, die notwendig ist, um eine therapeutische Wirkung zu erreichen, wurden als einzige mögliche Nebenwirkungen Verstopfung und vorübergehende Übelkeit genannt.

Konsultieren Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt.

5. Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln

Zu den Bestandteilen von FLUXAN sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln bekannt.

Jedoch sollten generell alle oralen Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel mindestens 2 Stunden vor oder nach der Anwendung von FLUXAN eingenommen werden.

5.1 Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Aufgrund seiner viskösen Eigenschaft kann das Medizinprodukt die Aufnahme gleichzeitig verabreichter Arzneimittel verzögern oder verringern. Konsultieren Sie daher einen Arzt, bevor Sie mit der Einnahme eines Produkts wie FLUXAN beginnen, insbesondere wenn Sie orale Empfängnisverhütungsmittel anwenden. Es bestehen keine Gegenanzeigen zur gleichzeitigen Gabe von pharmazeutischen Produkten wie Omeprazol, Cimetidin oder Cisaprid; in diesen Fällen ist es jedoch ratsam, einen Arzt zu konsultieren.

6. Lagerung

FLUXAN kühl und trocken aufbewahren, keiner direkten Wärmeeinwirkung oder Lichtquelle aussetzen.

Nicht anwenden, wenn das Sachet beschädigt ist.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Produkt zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren.

7. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden. Bei Jugendlichen (12–18 Jahre) darf das Produkt nur angewendet werden, wenn es unbedingt notwendig ist; die Anwendung hat unter ärztlicher Aufsicht zu erfolgen.

Schwangere oder stillende Frauen sollten das Produkt nur nach Konsultation eines Arztes einnehmen.

Die empfohlene Dosis darf nicht überschritten werden, da größere Mengen zu beginnender Verstopfung oder vorübergehendem Durchfall führen können.

Das Produkt ist kontraindiziert in Fällen chronischer Verstopfung oder chronischen Durchfalls, bei Nierenerkrankungen oder chronischem Herzversagen.

Das Produkt darf nicht länger als über maximal 30 aufeinanderfolgende Tage eingenommen werden.

Falls nach einiger Zeit der Anwendung keine eindeutige Linderung der Beschwerden eintritt, wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren.

Die Sachets sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und erst zum Zeitpunkt der Anwendung zu öffnen.

Bei Unverträglichkeit das Produkt nicht einnehmen.

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht einnehmen.

8. Ablaufdatum

Nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr einnehmen.

Das Ablaufdatum bezieht sich auf das in seiner unbeschädigten Verpackung gelagerte Produkt.


9. Entsorgung

Nach überschrittenem Ablaufdatum ist das Produkt gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das Produkt und seine Verpackung dürfen keinesfalls in der Umwelt entsorgt werden.



Hersteller:
SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIEN



Vertrieb:
Ardeypharm GmbH
Pharmazeutische Fabrik
Loerfeldstraße 20
58313 Herdecke
DEUTSCHLAND

Letzte Überarbeitung 01/2020