

Ginkgobakehl® D4 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Wirkstoff:	Ginkgo biloba e foliis sicc. D4
Zusammensetzung:	1 Ampulle zu 2 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2 ml Ginkgo biloba e foliis sicc. D4 dil. (HAB, Vorschrift 4a, mit Ethanol 62% (m/m), 11). Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Ethanol, Natriumchlorid.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
In der Naturheilkunde dokumentierte Anwendungsgebiete	Arzneimittelbild
Anwendung:	Täglich 2 ml i.m., i.v., s.c. oder i.c. injizieren.
Nebenwirkungen:	Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen. Darüber hinaus wurde bei Langzeitanwendungen über Einzelfälle von Blutungen berichtet, deren ursächlicher Zusammenhang mit der Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen nicht gesichert ist. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt befragt werden.
Gegenanzeigen:	Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba.

Unerwünschte Reaktionen:

Wechselwirkungen:

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Vorsichtsmaßnahmen:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Hinweis:

Dauer der Behandlung:

Handelsform:

1/10/50 Ampullen à 2 ml PZN 04525863/04525886/04525892.

Stand vom:

05/2002