

Wirkstoff: Pepsin Pulver vom Schwein. **Anwendungsgebiete:** Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe bezieht sich ausschließlich auf Übermüdigkeit und langjährige, Erwähnung. Bei Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen ein oder ein Teil der sonstigen Bestandteile. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Kennet, kann, Warnhinweise: Keine ausstehenden Untersuchungen vorliegen, soll Pepsin Wein, Dr. Poehlmann bei Schwangeren, während der Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält 16 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 20 ml bis zu 2,5 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Lebererkrankungen, Alkoholkrankheiten, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Dieses Arzneimittel enthält Glucose. Bei Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern bitte erst nach ärztlicher Rücksprache einnehmen. **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Bitte befolgen Sie die „Dosierungsanweisung auf diesem Etikett und fragen Sie bei Unklarheiten Ihren Arzt oder Apotheker. Erwachsene nehmen zu jeder Mahlzeit (in der Regel 3 x täglich) 20 ml (entspr. 60 mg Pepsin) mit dem Messbecher ein; zur Appetitanregung vor, bei Magenbeschwerden nach dem Essen. Die Einnahme sollte bis zum Abklingen der Magenbeschwerden erfolgen. Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete.



Pepsin Wein

Dr. Poehlmann

Flüssigkeit zur Anwendung
bei Erwachsenen

Traditionelles Arzneimittel
zur Verdauungsförderung



Wohlschmeckend!

Dr. Poehlmann & Co. GmbH
Loerfeldstr. 20 · 58313 Herdecke

700 ml
Flüssigkeit
zum Einnehmen

Ch.-B.-/ Verwendbar bis:

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Das gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht auf diesem Etikett angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit des Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!** Nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums soll dieses Arzneimittel nicht mehr angewendet werden. Nach Anbruch ist das Arzneimittel 14 Tage haltbar. **Wirkstoff:** 100 ml enthalten: Pepsin-Pulver vom Schwein, Protease mind. 0,95 Ph. Eur.-Einheiten/mg 300 mg, Glycerol, Zuckeräther E150, Aromastoff, Gereinigtes Wasser, Ethanol 96 % (V/V), Glucose-Monohydrat (Ph. Eur.). **Für Diabetiker:** 20 ml = 0,3 B.E. **Darreichungsform und Inhalt:** 700 ml Flüssigkeit zum Einnehmen.



PZN 1231842

Stand der Information: August 2021

Zul.-Nr.: 6009248.00.00