

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### **Ulco-cyl® L** **Ho-Len-Complex®** **Magen-Darm-Complex**

Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. **Was ist Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex und wofür wird es angewendet?**
2. **Was sollten Sie vor der Einnahme von Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex beachten?**
3. **Wie ist Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex einzunehmen?**
4. **Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
5. **Wie ist Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex aufzubewahren?**
6. **Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **1. WAS IST ULCO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® MAGEN-DARM-COMPLEX UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Entzündungen des Magen-Darm-Kanals, auch mit Geschwürsbildung.

##### **Hinweis:**

Bei Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen

#### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ULCO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® MAGEN-DARM-COMPLEX BEACHTEN?**

Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex darf nicht angewendet werden:

- Wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6 genannten Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind sowie
- bei Alkoholkranken.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex ist erforderlich:**

##### **Kinder:**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

##### **Bei Einnahme von Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex mit anderen Arzneimitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

##### **Anwendung von Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

##### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

##### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex enthält Alkohol:**  
Enthält 48 Vol.% Alkohol.

### **3. WIE IST ULCO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® MAGEN-DARM-COMPLEX EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne Rat eines homöopathisch erfahrenen Therapeuten nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

#### **Dauer der Anwendung:**

Die Dauer der Anwendung hängt von Art und Umfang der Beschwerden ab.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex vergessen haben:**

Holen Sie diese bitte nach, sobald Sie es bemerken. Nehmen Sie aber nicht die doppelte Dosis ein.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST ULCO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® MAGEN-DARM-COMPLEX AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

10 g (entsprechend 10,7 ml) Mischung enthalten:

Acidum nitricum	Dil. D4	1,5 g
Belladonna	Dil. D4	1,5 g
Carbo animalis	Dil. D8	1,5 g
Hydrastis	Dil. D4	2,0 g
Kreosotum	Dil. D6	1,5 g
Thuja	Dil. D6	2,0 g

1 g entspricht 23 Tropfen

#### **Wie Ulco-cyl® L Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex aussieht und Inhalt der Packung:**

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung / unverkäufliches Muster mit 30ml

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**



**Pharma Liebermann GmbH**  
Hauptstr. 27  
D- 89423 Gundelfingen/Donau  
Telefon: (09073) 95893-0  
Telefax: (09073) 95893-55  
E-Mail: [info@pharma-liebermann.de](mailto:info@pharma-liebermann.de)

Zul.-Nr. 6657906.00.00

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im April 2016 überarbeitet.