

	Weihrauch Tabletten								
Zusatzbezeichnung	Nahrungsergänzungsmittel mit Weihrauchextrakt								
Herstellung/Vertrieb	merosan Diätvertrieb GmbH, Spiegelbergstr. 50, 55283 Nierstein Fon: 06133 / 5783371 – Fax: 06133 / 5790643 – info@merosan.de								
Packungsgröße	Packung mit 25,5 g / 60 Tabletten								
PZN	10262959								
Zutaten	<p>Trägerstoff: Mikrokristalline Zellulose, Boswellia Serata Extrakt (65% Boswellia-Säure), Magnesiumtrisilikat, Trennmittel: Magnesium-salze der Speisefettsäuren (pflanzlich), Siliciumdioxid.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pro Tablette</th> <th>pro Tagesdosis 1Tabletten</th> <th>%NRV*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weihrauch-Extrakt</td> <td>100 mg</td> <td>100 mg</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>* NRV = Nährstoffbezugswert (Referenzmenge in %) Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011</p>		pro Tablette	pro Tagesdosis 1Tabletten	%NRV*	Weihrauch-Extrakt	100 mg	100 mg	-
	pro Tablette	pro Tagesdosis 1Tabletten	%NRV*						
Weihrauch-Extrakt	100 mg	100 mg	-						
									
Evtl. Allergieauslöser	./.								
Ernährungshinweise	<p>Extrakte aus dem Weihrauch werden in der indischen Ayurveda-Medizin schon seit Jahrhunderten erfolgreich bei verschiedenen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Der Extrakt stammt aus dem Harz der Arten Boswellia sacra bzw. Boswellia serrata, die vor allem in Südafrika und Indien gedeihen. Die wirksamen Bestandteile des Weihrauchs sind pentazyklische Triterpenoide, die unter dem Sammelbegriff Boswelliasäuren zusammengefasst werden. Hauptwirkstoff ist die 11-Keto-β-Boswelliasäure. Boswelliasäuren hemmen die Leukotriensynthese. Leukotriene können durch entsprechende Auslöser innerhalb von Sekunden freigesetzt werden und erhöhen damit die Gefäßpermeabilität, was unmittelbar zu Schwellungen des Gewebes führt. Boswelliasäuren wirken deshalb bei zahlreichen chronischen Krankheiten entzündungshemmend. Dazu gehören die rheumatoide Arthritis, die Psoriasis, das Asthma bronchiale sowie entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Neuere Untersuchungen weisen auch auf eine tumorhemmende Wirkung von Weihrauchextrakten hin. Die Toxizität und die Nebenwirkungsrate von Boswelliasäuren werden als äußerst gering bezeichnet. In mehreren placebokontrollierten Untersuchungen zeigten Weihrauchextrakte bei Patienten mit chronischer Polyarthritiden einen Rückgang der Schmerzen, der Schwellungen und der Gelenksteifigkeit in 60 bis 70 % der Fälle.</p>								
									
Verzehrempfehlung	Morgens 1 Tablette mit etwas Wasser nehmen								
Zusatz-Bemerkungen	Frei von Laktose, Hefe und Gluten – veganes Produkt								
Besondere Hinweise	trocken und nicht über 25 °C lagern								
Haltbarkeit	3 Jahre								