

Alpha Lipon Aristo® ist ein Arzneimittel, welches zur Behandlung von Missempfindungen bei diabetischer Polyneuropathie zugelassen ist. Die diabetische Polyneuropathie ist leider keine Seltenheit bei Diabetes-Patienten. Ungefähr 30 % der Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes haben eine periphere diabetische Polyneuropathie. Je nach Definition haben ungefähr 20-30 % der Patienten mit Typ-1-Diabetes und 12-22 % der Patienten mit Typ-2-Diabetes eine vegetative Neuropathie des Herz-Kreislaufsystems.1





Was ist die diabetische Polyneuropathie?

Die diabetische Polyneuropathie ist eine der häufigsten Komplikationen von Diabetes mellitus. Bei unzureichender Kontrolle des Blutzuckerspiegels kann es aufgrund von unbehandelter Hyperglykämie zu einer Beeinträchtigung der Sauerstoffversorgung der Nervenzellen durch "Verzuckerung" der Blutgefäße kommen. Dadurch können Funktionsstörungen in der Erregungsleitung der Nerven sowie Gefäßschäden entstehen. Eine frühzeitige Diagnose der diabetischen Polyneuropathie ist für die Therapie von großer Bedeutung. Je früher die Erkrankung erkannt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Komplikationen und Folgeschäden, wie Nekrosen (Absterben/Zerfall von Gewebe) oder gar Amputationen, zu vermeiden.

Die sensomotorische diabetische Polyneuropathie beginnt meistens in den Füßen und Beinen. Hände und Arme sind seltener betroffen.



Halten Sie mit Ihrem Arzt Rücksprache, sollten Sie eines der obengenannten Symptome bemerken.

Was ist Alpha-Liponsäure?

Alpha-Liponsäure, auch als Thioctsäure bezeichnet, dient im Körper als Coenzym, kann aggressive Sauerstoffradikale abfangen und hat eine starke antioxidative Wirkung. Sie trägt zur gesunden Funktion der Nervenleitung bei und verbessert die Durchblutung der Nerven. Der Wirkstoff ist für die Behandlung von Missempfindungen bei diabetischer Polyneuropathie zugelassen und eine der wenigen Substanzen, die auf das Erkrankungsgeschehen der Nervenschädigung Einfluss nehmen kann.



Polyneuropathie verbessern? Eine Polyneuropathie lässt sich nicht rückgängig machen. Durch Therapie und

Vorsorgemaßnahmen kann jedoch ein Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt und die vorhandenen Beschwerden gelindert werden. Eine gut durchgeführte und engmaschige Kontrolle der Blutzuckerwerte ist hierbei essenziell. Auch eine gesunde Ernährung sowie körperliche Aktivität spielen eine wichtige Rolle. Neben den routinemäßigen ärztlichen Kontrollen ist eine tägliche Fußinspektion zu empfehlen. Durch eine regelmäßige Fuß- und Nagelpflege durch einen Podologen können Veränderungen oder Verletzungen frühzeitig erkannt werden, wodurch

Nekrosen und Amputationen vermieden werden können.

Wie muss ich die Alpha Lipon Aristo® Filmtabletten einnehmen?

bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Soweit nicht anders verordnet, beträgt die Tagesdosis 1 Filmtablette Alpha Lipon Aristo®

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben

(entsprechend 600 mg Thioctsäure), die als Einmaldosis etwa 30 Minuten vor der ersten Mahlzeit eingenommen werden soll.

Wie lange muss ich Alpha Lipon Aristo® Filmtabletten einnehmen?

Da es sich bei der diabetischen Nervenschädigung um eine chronische Erkrankung handelt, kann es sein, dass Sie Alpha Lipon Aristo® dauerhaft einnehmen müssen. Im Einzelfall entscheidet Ihr

behandelnder Arzt.

Weitere Informationen finden Sie auf:

Quelle: ¹Diabetische Neuropathie und Polyneuropathie. (o. D.)

www.alpha-lipon-aristo.de

