

# Ibu-LysinHEXAL®

## Für schnelle Hilfe bei Kopfschmerzen und Migräne\*

### Ibu-Lysin HEXAL® Filmtabletten



#### Besonders schnell\*\* und langanhaltend schmerzlindernd

- Bei Migräne mit oder ohne Aura
- Mit dem bewährten Schmerzmittel Ibuprofen (400 mg)
- Besonders schnell: Wirkeintritt bereits nach ca. 15 Minuten – durch die Kombination mit der Aminosäure DL-Lysin \*\*
- Langanhaltend: Schmerzlinderung bis zu 8 Stunden

#### Für die schnelle Hilfe bei Migräne-Kopfschmerzen\*

Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen hat sich der Wirkstoff Ibuprofen vielfach bewährt. Ibu-LysinHexal® ist dabei besonders schnell. Durch die Kombination mit der Aminosäure Lysin kann der Wirkstoff Ibuprofen schneller vom Körper aufgenommen werden – der Wirkeintritt erfolgt bereits nach ca. 15 Minuten.

Eine schnelle Schmerzlinderung ist besonders bei akuten Migräne-Kopfschmerzen wichtig, denn Bewegung verstärkt den Kopfschmerz bei Migräne in der Regel. Bei einer akuten Attacke ist es daher gut, ein geeignetes Ibuprofen-Präparat griffbereit zu haben, um nicht erst die nächste Apotheke aufsuchen zu müssen.

#### Schnelle\*\* Wirkung

Ibu-LysinHEXAL® Filmtabletten enthalten den bewährten Wirkstoff Ibuprofen als sehr gut lösliches DL-Lysin-Salz. Dieses kann besonders schnell\*\* vom Körper aufgenommen werden und beschleunigt so den Wirkeintritt. Ibuprofen ist gut erforscht und gehört zu den bekanntesten Arzneimitteln gegen Schmerzen, Entzündungen und Fieber. Der Wirkstoff hemmt die Bildung sogenannter Prostaglandine, die für die Weiterleitung von Entzündungs- und Schmerzsignalen im Körper verantwortlich sind. Leichte bis mäßig starke Schmerzen und Fieber können so langanhaltend bis zu 8 Stunden gelindert werden.

\* Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura.

\*\* Schneller Wirkeintritt durch besonders gute Löslichkeit von DL-Lysinsalz

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG FÜR ERWACHSENE:

Anfangsdosis: Nehmen Sie 200 mg oder 400 mg Ibuprofen ein (½ oder 1 Tablette Ibu-LysinHEXAL®). Falls notwendig, nehmen Sie zusätzlich 200 mg oder 400 mg Ibuprofen ein (½ oder 1 Tablette), aber überschreiten Sie nicht die Gesamtdosis von 1200 mg Ibuprofen (3 Tabletten) innerhalb von 24 Stunden. Der Abstand zwischen den einzelnen Dosen sollte nicht weniger als 6 Stunden betragen.

Für Personen mit empfindlichem Magen ist es ratsam, Ibu-LysinHEXAL® während der Mahlzeiten einzunehmen. Der Wirkungseintritt kann dadurch etwas verzögert werden. Das Arzneimittel ist zur kurzzeitigen Anwendung bestimmt. Sollten sich die Beschwerden nicht innerhalb von drei Tagen bei Migränekopfschmerzen oder Fieber oder innerhalb von vier Tagen Schmerzbehandlung bessern oder sogar verschlimmern, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Dosierung für Kinder ab 20 kg Körpergewicht (etwa 6 Jahre) und Jugendliche:

KÖRPERGEWICHT	EINZELDOSIS	MAX. TAGESDOSIS
20 kg – 29 kg	200 mg (½ Tablette)	600 mg (1 ½ Tabletten)
30 kg – 39 kg	200 mg (½ Tablette)	800 mg (2 Tabletten)
40 kg und mehr	200 – 400 mg (½ – 1 Tablette)	1200 mg (3 Tabletten)



#### Schmerzmittel in der Hausapotheke

Schmerzen\* treten häufig wie aus dem nichts auf und machen ein konzentriertes Arbeiten zunichte. Gut, wenn man dann ein geeignetes Schmerzmittel wie Ibu-LysinHEXAL® in der Hausapotheke parat hat.



#### Kopfschmerzen und Migräne

Bei Spannungskopfschmerzen und Migräne ist ein Arzneimittel gefragt, das schnell hilft. Dank der Kombination mit DL-Lysin tritt die schmerzlindernde Wirkung des Inhaltsstoffs Ibuprofen besonders rasch\*\* ein.



#### Für Kinder ab 6 Jahren

Ibu-LysinHEXAL® kann bereits Kindern ab 20 kg Körpergewicht (etwa 6 Jahre) zur Behandlung bei Schmerzen und Fieber verabreicht werden. Die Filmtabletten sind teilbar und können somit altersgerecht dosiert werden.

\*leichte bis mäßig starke Schmerzen

\*\*Schneller Wirkeintritt durch besonders gute Löslichkeit von DL-Lysinsalz

### HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

#### Welche Bestandteile sind in Ibu-LysinHEXAL® enthalten?

Der Wirkstoff ist Ibuprofen-DL-Lysin. Jede Filmtablette enthält 684 mg Ibuprofen-DL-Lysin (1:1), das entspricht 400 mg Ibuprofen.

Der Tablettenkern enthält außerdem mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid und Magnesiumstearat. Im Filmüberzug sind Hypromellose, Macrogol 6000 und Glycerol 85 % enthalten.

#### Darf ich nach der Einnahme von Ibu-LysinHEXAL® Auto fahren?

Bei der Einnahme von Ibu-LysinHEXAL® kann es zu Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel und Sehstörungen kommen. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr sowie zum Bedienen von Maschinen kann deshalb im Einzelfall eingeschränkt sein. Das gilt in verstärktem Maße in der Kombination mit Alkohol.

**Ibu-LysinHEXAL® 400 mg Filmtabletten, Wirkstoff:** Ibuprofen (als Ibuprofen-DL-Lysin (1:1)). **Anwendungsgebiete:** Symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen sowie Fieber und Schmerzen im Zusammenhang mit Erkältungen. Symptomatische Behandlung der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura. Zur Anwendung bei Kindern ab 20 kg Körpergewicht (etwa 6 Jahre), Jugendlichen und Erwachsenen. **Warnhinweis:** Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke!**  
**Nr.:** 2/51016383 **Stand:** Januar 2024 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, [www.hexal.de](http://www.hexal.de)