



MediPreis Produktsteckbrief



keine Abbildung

NAGEL BATRAFEN A
NAGEL BATRAFEN A Lösung

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH GB Selbstmedikation
/Consumer-Care

PZN: 03783020

Menge: 5 g

Art: Lösung

Link: <https://www.medipreis.de/03783020>

NAGEL BATRAFEN A - Bei Pilzkrankungen der Nägel.

Wenden Sie Nagel Batrafen A immer genau nach der Anweisung in der Packungsbeilage an. Soweit nicht anders verordnet wird Nagel Batrafen A im ersten Monat jeden zweiten Tag in dünner Schicht auf den erkrankten Nagel aufgetragen. Damit wird erreicht, dass der Nagel mit dem Wirkstoff gesättigt wird. Im zweiten Behandlungsmonat: 2x wöchentlich.

Anwendungsgebiete

Das Medikament wird angewendet bei

Pilzkrankungen der Nägel.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen

Das Medikament darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Ciclopirox oder einen der sonstigen Bestandteile des Medikaments sind,
- bei Kindern und in der Schwangerschaft und Stillzeit wegen fehlender klinischer Daten.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung des Medikaments ist erforderlich

Schwangerschaft

Wegen fehlender klinischer Erfahrungen ist die Anwendung des Medikaments bei in der Schwangerschaft nicht angezeigt.



Stillzeit

Wegen fehlender klinischer Erfahrungen ist die Anwendung des Medikaments in der Stillzeit nicht angezeigt.

Nebenwirkungen

Wie alle Medikamente kann auch dieses Nebenwirkungen haben. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

- sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten
- häufig: weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
- gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1 000 Behandelten
- selten: weniger als 1 von 1 000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
- sehr selten: weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Welche Nebenwirkungen können im Einzelnen auftreten?

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort. Sehr selten wurde bei Kontakt der um den Nagel liegenden Haut mit dem Medikament Rötung und Schuppung beobachtet. Selten tritt allergische Kontaktdermatitis (Entzündung der Haut) auf.

Anwendung und Dosierung

Art und Dauer der Anwendung

Zum Auftragen auf die Nägel. Vor Beginn der Behandlung mit dem Medikament sollte z.B. mit einer Schere oder mit den beiliegenden Einweg-Nagelfeilen so viel wie möglich von dem zerstörten Nagelmaterial entfernt werden. Die Dauer der Anwendung ist abhängig vom Schweregrad des Befalls, sollte aber einen Behandlungszeitraum von 6 Monaten ohne ärztlichen Rat nicht überschreiten. In dieser Zeit werden die Erreger der Nagelpilzinfektion im Allgemeinen abgetötet. Wenn Sie unsicher sind, ob die Behandlung fortgeführt werden muss, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Dosierung

Im ersten Monat das Medikament jeden zweiten Tag in dünner Schicht auf den erkrankten Nagel auftragen. Damit wird erreicht, dass der Nagel mit dem Wirkstoff gesättigt wird. Im zweiten Behandlungsmonat kann die Anwendung dann auf mindestens zweimal wöchentlich, ab dem dritten Behandlungsmonat auf einmal wöchentlich verringert werden. Während der gesamten Anwendungsdauer wird einmal wöchentlich die gesamte Lackschicht mit den beigefügten Alkoholtupfern abgelöst. Hierbei sollte erneut so viel wie möglich von dem veränderten Nagelmaterial mit den Einweg-Nagelfeilen entfernt werden. Bei zwischenzeitlichem Auftreten von Beschädigungen der Lackschicht genügt es, nur die abgesplitterten Stellen neu mit dem Medikament zu überpinseln.

Sonstige Hinweise

Teilnahme am Straßenverkehr und Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.



Der Preisvergleich für Medikamente



NAGEL BATRAFEN A Lösung bei MediPreis: <https://www.medipreis.de/03783020>

Dokument erstellt am 20.06.2019, 10:38:16 Uhr.